

Algunas observaciones sobre los caracteres antropológicos de los primitivos habitantes de Córdoba

(Nota preliminar)

POR

Alberto Rex González

No existe hasta el momento actual ningún estudio sistemático de los restos óseos de los habitantes protohistóricos de Córdoba. Algunas referencias, muy vagas por cierto, se pueden encontrar dispersas en los trabajos pertenecientes a la primera época de los estudios prehistóricos, ellas se refieren a las características somáticas generales de los cráneos hallados en diversos yacimientos. Estudios métricos no se han realizado hasta el presente.

Las causas fundamentales de este olvido por la antropología física de los aborígenes de nuestra provincia residen: a) Ausencia de exploraciones intensivas sobre el terreno; b) Ausencia de cementerios, que pudieran haber suministrado buen número de sujetos medibles. La práctica inhumatoria corriente es la sepultura individual aislada.

Estamos aún empeñados en la tarea de reunir la mayor cantidad de restos utilizables. Hemos acudido a las colecciones particulares, a la incipiente colección antropológica del Instituto de Arqueología de la Universidad, a las existentes en los Museos de Buenos Aires y a la obtenida personalmente en ocasiones diversas. A pesar de ello, y se demuestra así la escasez de material, no he logrado conseguir una serie lo suficientemente numerosa como pa-

ra extraer de ella conclusiones de valor antropológico incuestionable.

Aparte de estas dificultades en la obtención del material, el estudio de la antropología física de los primitivos de Córdoba presenta otros caracteres particulares que contribuyen a darle una mayor complejidad.

Por su ubicación geográfica, en la zona central, la provincia de Córdoba ha estado rodeada por agrupaciones raciales fundamentalmente distintas: Andidos en el N. y el O.; Pámpidos por el S. y el E. A estos dos grupos principales deben agregarse otros pueblos aledaños cuya filiación racial es hasta ahora poco conocida, y finalmente, es necesario tener en cuenta los núcleos étnicos vinculados a una tercera y bien definida entidad racial —Láguidos— a la que pertenecen parte de los antiguos habitantes del litoral paranaense, que junto a pueblos Pámpidos, compartieron las regiones limítrofes del E.

Como todas las zonas intermedias o de tránsito, la influencia de tipos raciales diversos por la que estuvo rodeada, se debe haber hecho sentir con grados variables de intensidad, conspirando en definitiva, con la existencia de agrupaciones racialmente contaminadas.

Además, agréguese el hecho de las frecuentes importaciones de pueblos indígenas efectuadas en épocas posteriores a la conquista y a la proveniencia de buena parte del material de yacimientos poblados hasta épocas post-hispánicas (San Roque, Rumpal, Soto), lo que puede lógicamente plantear la duda de si se trata de sujetos autóctonos o importados.

Finalmente, es necesario tener en cuenta la falta de uniformidad en la procedencia. Muy lejos del ideal de series numerosas de idéntico origen.

A simple título de ilustración, sin pretender extraer conclusiones de ninguna clase y adelantándonos al estudio, actualmente en curso, acompañamos los principales caracteres métricos de una serie masculina de 10 cráneos, utilizando parte de las medidas de la convención de Mónaco, una tabla de estatura de 15 sujetos y una tabla de los principales índices craneanos.

TABLA 1

CRANEOMETRIA
AÑO 31. N.º 4 SETIEMBRE-OCTUBRE 1944

<i>Procedencia</i>	Diám. ant. post. máximo.	Diám. transv. máximo.	Altura básilobregmática.	Diám. frontal mínimo.	Diám. frontal máximo.	Anchura himas-toidé.	Anchura bicigomática.	Diám. nasio-basilar.	Diám. alvéolo-basilar.	Altura nasio-alveolar.	Altura nariz.	Anchura de la abert. pyriformis	Anchura de la órbita.	Altura de la órbita.	Longitud del paladar.	Anchura del paladar.	Long. del foramen-magnun.	Anchura del foramen-magnun.	Curva sagital Nasioo-pistion	Curva transver-sal.	Capacidad.
Cerro Colorado	167	143	138	93	122	106	—	101	93	66	47	25	42	39	40	43	38	31	356	318	1485
Soto	168	143	136	91	118	106	—	105	102	70	53	23	42	37	—	37	35	30	342	307	—
Soto	171	139	137	91	—	—	—	113	—	—	—	—	—	—	—	—	37	31	354	311	1375
Rumipal	181	137	125	98	117	111	135	96	90	66	54	26	44	39	43	42	38	—	363	299	1380
Río Tercero	162	145	143	94	120	136	142	97	94	—	—	28	46	37	—	43	35	35	355	345	1450
Dto. San Javier	167	156	143	101	131	—	149	100	105	77	53	24	47	39	49	42	38	31	—	—	1660
Yacanto	164	156	135	108	125	—	150	100	99	68	56	29	45	39	43	44	37	31	345	340	1500
Thea	162	152	149	96	126	113	149	101	98	77	55	25	46	37	50	44	36	28	359	340	1505
Córdoba (Cap.)	150	149	141	99	126	112	139	104	99	70	52	24	46	38	46	36	34	32	327	326	1225
Quillinzo	155	149	142	—	—	—	—	104	98	73	56	27	46	41	45	42	38	30	334	—	—

Las estaturas fueron obtenidas en base a las mediciones efectuadas en el fémur o la tibia y a la aplicación de las tablas de Manouvrier.

De los 26 cráneos que hemos examinado hasta ahora, 23 presentan signos indudables de deformación artificial. Pertenecen en su casi totalidad a tipo tabular erecto de la clasificación del Dr. Imbelloni. Sólo dos casos no se presentan muy claros. Todos los sujetos incluidos en la tabla adjunta son deformados.

I N D I C E S

LOCALIDAD	Cefálico- horizontal	Vértico longitudinal	Vértico transversal	Frontal	Facial su- perior	Nasal	Orbitario	Palatino	Del Foramen
Cerro Colorado	85,8	82,6	96,5	76,2	—	53,1	92,8	107,5	81,5
Soto	85,1	80,9	95,1	77,1	—	43,3	83,3	—	88,5
Soto	81,2	80,1	98,5	—	—	—	—	—	83,9
Rumipal	75,6	68,5	90,5	83,7	48,8	48,5	88,6	97,6	—
Río Tercero	89,5	88,2	98,6	78,3	—	—	80,4	—	100
Dpto. San Javier	93,4	85,6	91,6	78,1	51,6	45,2	82,9	85,7	81,5
Yacanto	95,1	82,3	86,5	86,4	45,3	51,7	86,6	102,3	83,7
Thea	93,8	91,9	98	76,1	51,6	45,4	80,4	88	77,7
Córdoba (Cap.)	99,3	94	94,6	78,5	50,3	46,1	82,6	78,2	94,1
Quillinzo	96,1	91,6	95,3	—	—	46,8	89,1	93,3	78,9

ESTATURA

Tomadas en el femur

Procedencia	Sexo	Estatura
Rumipal	♂	1,629
Rumipal	—	1,767
Rumipal	—	1,716
Olaen	♂	1,671
Olaen	♂	1,757
Olaen	♀	1,572
Soto	♂	1,618
Córdoba	♂	1,652
Saldán	—	1,677
Ongamira	♂	1,667
Ongamira	♀	1,572

Tomadas en la Tibia

Rumipal	♂	1,692
Rumipal	♂	1,658
Cerro Colorado	♂	1,660
Olaen	♀	1,570

Resumiendo los cuadros anteriores y con las reservas ya apuntadas, podemos concluir que, provisoriamente, los caracteres antropológicos de los restos medidos son los siguientes.

Sujetos de talla inferior a la mediana, 1,63 en el individuo vivo. Con el cráneo deformado artificialmente — Tabulares erectos—; que arrojan un índice cefálico horizontal de 89,4 (Hiperbraquicéfalos); con un índice Vértico-longitudinal de 84,5 (Megasemos) y 94,5, de índice Vértico-transversal (Metriocéfalos). El índice facial superior arroja un promedio de 49,5 (Eurienos o Mesoprosopos); el índice nasal 47,5 (Mesorrinos); el índice orbitario 85,5 (Hipsiconcos) y el índice palatino 93,2 (Braquistafilinos). La capacidad craneana media de la serie da una cifra de 1447 cc.

Por los caracteres craneométricos que anteceden, pueden ubicarse, pues, éstos indígenas, entre los límites ofrecidos por las variantes que muestran entre sí los distintos pueblos que integran la unidad racial conocida bajo el nombre de Pueblos Andidos.

Se apartarían de ellos, con ligero aumento de las cifras en nuestro grupo, en lo que se refiere a la talla y a la capacidad craneana. En nuestro trabajo final, volveremos sobre estos caracteres, extremando el análisis comparativo de los mismos, por el momento sólo nos detenemos a indicar esas diferencias.