



Comunicaciones Orales

1998

Autores: JIMENEZ C.

LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE PRONTA ATENCIÓN EN EL TERRITORIO DEL GRAN BUENOS AIRES ENTRE EL AÑO 2011 Y EL AÑO 2015

Introducción: La situación socio-sanitaria de la provincia de Buenos Aires -particularmente del conurbano- demandó la resolución de la atención de la “emergencia” producida por la dinámica social en el territorio. En este contexto, la implantación de tecnologías en los servicios sanitarios locales se tornó central para la resolución inmediata de las demandas sanitarias de la urgencia.

Objetivo: El objetivo consistió en analizar la trama de las relaciones políticas e institucionales que habilitaron el desarrollo territorial de las Unidades de Pronta Atención (UPA) en el Gran Buenos Aires. Este trabajo forma parte de uno de los objetivos específicos de una investigación más amplia donde se intenta indagar sobre modelo de atención de las Unidades de Pronta Atención y cuál es su rol en la red de servicios del sistema público en el Gran Buenos Aires entre el 2011 y 2015.

Material y Metodología: Este trabajo utilizó una metodología cualitativa de análisis de fuentes secundarias. Para la reconstrucción de la dimensión Político / Institucional analizamos diferentes documentos, y realizamos un relevamiento y sistematización de datos socio demográficos, de estructura sanitaria y del financiamiento sanitario. **Resultados:** Los atributos innovadores del dispositivo “UPA” habilitaron su desarrollo rápido y efectivo desarrollo en el territorio del conurbano en municipios con poca respuesta a la “emergencia”. La localización de las UPAS respondió a diversos criterios definidos por los actores de la gestión.

Conclusión: Se observa una baja institucionalidad -por diversos factores- en la conformación de las UPAS, en consecuencia se desarrollaron tantos modelos de UPAS como condiciones territoriales locales.

2001

Autores: ARIAS PEREZ R., ESPINOSA MONTOYA T.
 Corporación Universitaria Remington, Medellín, Colombia.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER INFLIGIDA POR SU PAREJA EN EL VALLE DE ABURRÁ, ANTIOQUIA – COLOMBIA

Introducción: La violencia de pareja en Colombia es un problema de salud pública significativa por las consecuencias socio-económicas que genera y afecta principalmente a las mujeres; se ha reportado que más de un tercio de las mujeres en el país la ha padecido, aspectos que sustentan la importancia de investigar el fenómeno, permitiendo reconocer los indicadores, como base para mejorar la salud y reducir el sufrimiento de las mujeres víctimas.

Objetivo: Identificar la frecuencia, las características sociodemográficas y severidad de la violencia contra la mujer infligida por su pareja en el Valle de Aburrá del 2010 al 2015.

Metodología: estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, usando como fuente de información el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, explorando los indicadores de mujeres que denunciaron violencia de pareja y asisten a valoración médico legal en el Valle de Aburrá entre los años 2010-2015.

Resultados y discusión: se encontraron 22.390 casos de violencia de pareja con tendencia al aumento, presentando como principal víctima a mujeres jóvenes de 20 a 39 años, es de resaltar que el 82% de las víctimas tenían antecedentes de agresión previa por su pareja, al analizar las repercusiones físicas de la agresión, se emitió una incapacidad médico-legal en el 76,11% de los hechos, lo que se constituye como un indicador importante de la gravedad del problema.

Conclusión: las mujeres jóvenes son las principales víctimas y denuncian después de varias agresiones. Ahora bien, existe la violencia entre parejas del mismo sexo, pero los agresores más comunes son hombres.

2002

Autores: FRANCHINI G., FERNÁNDEZ R., BLANCO M., EANDI M., DÍAZ M., BUTINOF M.

CONSTRUCCIÓN DE ESCALAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A PLAGUICIDAS EN EL CINTURÓN VERDE DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Introducción: Estimar la exposición humana a plaguicidas representa un desafío para la salud pública. Los algoritmos de exposición, un método indirecto de evaluación, utilizan datos provenientes de prácticas laborales y hábitos del trabajador, permitiendo construir escalas de exposición mediante el cálculo de un índice de intensidad de exposición (IIE) y un índice de exposición acumulada (IEA) para cada trabajador.

Objetivo: construir escalas de exposición a plaguicidas para la población de trabajadores hortícolas del Cinturón Verde de Córdoba a fin de estimar niveles de riesgo para la salud.

Métodos: Se consideraron 93 unidades de producción para exponer resultados de 101 trabajadores con un 95% de confianza. Se implementó un cuestionario indagando aspectos sociodemográficos, productivos, prácticas laborales, vida cotidiana y salud de los trabajadores. Mediante combinación de variables adaptadas de Dosemeci et al., (2002), se construyeron dos algoritmos, dando origen a los IIE y IEA. Usando técnicas de simulación Montecarlo, se estimaron empíricamente los percentiles de riesgo de la población. Las escalas fueron validadas mediante panel de expertos con un nivel de confiabilidad de 0,80. Se utilizó el software STATA 14.0.

Resultados: Fueron adoptados los percentiles 20 y 55 (P20 y P55) como puntos de corte, correspondiendo a los valores 1,84 y 4,02 respectivamente para el IIE y valores de 585 y 2019 para el IEA. La población fue clasificada con nivel bajo de exposición (menor P20), medio (P20 -P55) y alto, mayor al P55 25% de la población presentó nivel de exposición bajo, 30% medio y 45% alto.

Conclusión: Esta metodología constituye una herramienta útil en salud pública afines de identificar grupos de trabajadores con diferentes niveles de riesgo, así como para vigilancia de la exposición en el tiempo.

2005

Autores: PIEMONTE E., CASTILLO G., BELARDINELLI P., BRUNOTTO M., LAZOS J., SECCHI D., TALAVERA A., LANFRANCHI H.

INDICE DE RIESGO MULTIFACTORIAL PARA CÁNCER BUCAL

Objetivo: Categorizar riesgo de cáncer bucal mediante índice multifactorial.

Pacientes y métodos: 53 pacientes con cáncer bucal y 100 controles fueron examinados en Facultad de Odontología, UNC (2009-2013). Edad, género, índice de masa corporal, tabaco activo y pasivo, alcohol, bebidas calientes, trauma crónico de mucosa oral, desórdenes potencialmente malignos, candidiasis, VPH, pérdida dentaria, prótesis desadaptadas, dieta, carcinógenos ambientales, As en agua de consumo e historia familiar de cáncer fueron registrados. Modelo 1: un punto por variable. Modelo 2: variables significativas de análisis univariado. Modelo 3: variables significativas de análisis univariado que no requieren inspección clínica para registro. Modelo 4: variables significativas de análisis multivariado. Cada paciente obtuvo un puntaje total sumando los valores de los OR de las variables presentes en el mismo. La diferencia del riesgo de cáncer bucal entre los pacientes de mayor y menor puntaje fue analizada mediante X². Se evaluó sensibilidad y especificidad, con validación cruzada leave-one-out.

Resultados: En los cuatro modelos mayor puntaje estuvo asociado con mayor riesgo de cáncer bucal. Modelo 1, OR: 7.9; Modelo 2, OR: 50; Modelo 3, OR: 3.17; Modelo 4, OR: 28.16. Sensibilidad, especificidad, razón de verosimilitud positiva, razón de verosimilitud negativa fueron: Modelo 1, 0.86, 0.49, 0.9, 0.14; Modelo 2, 0.94, 0.75, 2, 0.04; Modelo 3, 0.68, 0.6, 0.9, 0.28; Modelo 4, 0.73, 0.91, 4.33, 0.15.

Conclusiones: La acumulación de factores carcinogénicos se relaciona a mayor riesgo de cáncer bucal. El índice de riesgo multifactorial obtenido resulta adecuado para programas de monitoreo y prevención de cáncer bucal, y debe ser ejecutado por profesionales adecuadamente entrenados en medicina bucal.

2014

Autores: RIVADERA S., BLANCO S., VIALE F., PEDRANTI M., GALLEGO S., ADAMO M.

SEROREVALENCIA (IGG) DE PARVOVIRUS HUMANO B19 EN DONANTES DE SANGRE DE CÓRDOBA, ARGENTINA, 2014

Introducción. El parvovirus humano B19 (B19V), agente etiológico del eritema infeccioso, tiene distribución endemo-epidémica global. Se reconoce como contaminante de productos derivados de la sangre debido a sus propiedades físicas, a los altos títulos virémicos que se alcanzan antes de la aparición de las manifestaciones clínicas y a la persistencia del agente en algunos individuos. Sin embargo, aún no se ha descripto la seroprevalencia de B19V entre donantes de sangre de Argentina.

El objetivo de este trabajo fue determinar la prevalencia de IgG anti-B19V en dicha población.

Métodos: estudio retrospectivo descriptivo de corte transversal. Se analizó una muestra aleatoria mínima de individuos de ambos sexos, mayores de 18 años, sin manifestaciones clínicas de enfermedad, concurrentes a la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba entre el 1 de julio y 31 de diciembre de 2014. Se determinó la presencia de IgG en una muestra de plasma por individuo mediante ensayo tipo ELISA de la firma R-Biopharm (Ridascreen).

Resultados: se testaron 358 individuos de 18 a 64 años de edad (46,4% mujeres, IC95%: 41-51). Del total de muestras analizadas, 55 resultaron negativas (15,4%, IC95%: 12,0-19,5), 279 positivas (77,9%, IC95%: 73,4-81,9) y 25 indeterminadas (6,7%, IC95%: 4,6-9,8).

Conclusión y perspectivas: en coincidencia con datos previos en adultos sanos de nuestra población, se reporta elevada frecuencia de IgG anti-B19V en donantes de sangre durante el año 2014. Los brotes epidémicos identificados en Córdoba en 2007 y 2013 justifican las altas prevalencias. La amplia circulación de B19V alerta sobre la posible ocurrencia de infecciones persistentes entre donantes, lo cual podría representar un riesgo para los receptores susceptibles de sangre y derivados.

2016

Autores: CHESINI F., FONTÁN S., GONZÁLEZ MORINIGO E., HERRERA N., SAVOY F., DE TITTO E.

MORTALIDAD DURANTE LAS OLAS DE CALOR DEL VERANO 2013-2014 EN EL NORESTE ARGENTINO

Las olas de calor son una amenaza para la salud y su impacto sanitario es reconocido internacionalmente, registrándose incrementos en la morbi-mortalidad. Según los registros históricos las olas de calor ocurridas en el verano 2013-2014 han sido particularmente intensas.

Se propuso analizar y caracterizar la mortalidad durante las olas de calor del verano 2013-2014. Se realizó un estudio epidemiológico de tipo ecológico, comparando la mortalidad acaecida durante las olas de calor contra el promedio del mismo período para los años 2010-2012 (todos con ausencia del fenómeno). Se calcularon tasas de mortalidad general y específica según edad, sexo y causas de defunción, como también riesgos relativos.

Durante el verano 2013-14, en la región del noreste, se registraron tres olas de calor; una en diciembre que afectó a Chaco, Corrientes y Formosa (6 días de duración); y las de enero y febrero a las cuatro provincias, con duraciones de 7 y 13 días respectivamente. Sólo en la ola de calor de febrero se observaron incrementos estadísticamente significativos en los riesgos relativos para: mortalidad general, mortalidad en sexo masculino (Chaco y Corrientes) y femenino (Misiones), en mayores de 60 años (Formosa) y en mayores de 80 años (Chaco). Las causas de defunción con significativo incremento del riesgo fueron las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares. Durante las olas de calor de diciembre y enero se hallaron leves incrementos en casos y tasas, sin significancia estadística.

La mortalidad se vio incrementada durante la ola de calor de febrero de 2014 ocurrida en el noreste argentino. Estos hallazgos resultan de relevancia para la planificación de medidas sanitarias, a fin de adaptar los sistemas de salud a un escenario de clima cambiante.

2020

Autores: CASTRO M., GOMEZ C., BASUALDO C., ARREDONDO D., MERCADO N., UGNIA L.

HORTALIZAS LISTAS PARA CONSUMO: DETECCIÓN DE MICROORGANISMOS INDICADORES DE CONTAMINACIÓN. RESULTADOS PRELIMINARES

Actualmente, un gran número de personas tiene al menos una comida fuera del hogar, y un creciente interés por productos frescos de fácil y rápido consumo. Esta tendencia llevó a los agentes del rubro, a instaurar los vegetales mínimamente procesados. La demanda de hortalizas frescas listas para su consumo aumentó en Argentina y no existe información suficiente sobre la frecuencia de bacterias patógenas ni de la incidencia de enfermedades asociadas al consumo de las mismas. El objetivo del presente trabajo es detectar y cuantificar indicadores de contaminación patógena en hortalizas mínimamente procesadas de distintos comercios de la ciudad de Río Cuarto.

Se tomaron muestras de hortalizas procesadas listas para la venta en: bandejas envasadas con Atmósfera Modificada (ATM), cubiertas con film y sin cobertura, durante 2016-2017. Para detección y recuento de Coliformes Fecales y *Escherichia coli*, se procedió según Bacteriological Analytical Manual FDA 2011 y para *Staphylococcus aureus* se usó como método de referencia normas ISO 6888-3-1999.

Con respecto al recuento de Coliformes fecales, en el 100% de las bandejas envasadas con ATM, el NMP/g fue <3; en el 62 % de las bandejas solo cubiertas con film, el NMP/g fue >3, y se identificó *E. coli*. En bandejas sin cobertura, el 75% mostró un NMP/g >3. En ninguna de ellas hubo desarrollo de *S. aureus*.

Estos resultados preliminares muestran una notable contaminación, inquietante, si tenemos en cuenta que estos productos pueden consumirse sin un proceso de lavado previo, por lo tanto se deberían implementar rigurosamente medidas de prevención sobre manipuladores de alimentos.

2025

Autores: GARCÍA G., ÁVALOS M., ROBLES M., SEPICH M., RASKOVKY V., ADAMO M.

DETECCIÓN DE BOCAVIRUS EN PACIENTES AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS CON INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA DE SALTA, ARGENTINA

Introducción. El Bocavirus humano 1 (HBoV1) se asocia a neumonía en lactantes, pero los datos de pacientes ambulatorios y adultos son fragmentarios. Dado que no hay registro de este virus en Salta, el objetivo de este trabajo fue estudiar la presencia de HBoV1 en pacientes con infección respiratoria aguda (IRA) de Salta. **Materiales y métodos.** Diseño: observacional, retrospectivo, de corte transversal. Se seleccionó una muestra mínima aleatoria de 213 pacientes con IRA de todas las edades, hospitalizados y ambulatorios, captados por el programa de vigilancia de virus respiratorios en la provincia de Salta durante 2012. Se detectó HBoV1 por PCR en las secreciones respiratorias. Se expresan aspectos epidemiológicos en rangos, medidas de tendencia central y dispersión o frecuencias e IC95%. La significancia de las diferencias observadas se evaluó con la prueba Fisher (α 0.05).

Resultados. La muestra incluyó pacientes de 8 días a 65 años (mediana 6 meses), 95/213 (44,6%) de sexo femenino; 197 con registro de estado, 170 (86,3%) hospitalizados. En la muestra global se detectaron 10/213 pacientes HBoV1+ (4,7%, IC95% 2,6-8,4), 7/10 de sexo femenino (70%, OR 2,90, IC95%: 0,7-11,5) y 4/10 (40%) en co-infección. Rango de edad de pacientes HBoV1+: 22 días-14 meses, 8 (80%) menores de 1 año (mediana 8 meses). Los casos ocurrieron en las semanas 1 a 39, 8/10 (80%) entre fin de otoño e invierno y 8/9 pacientes (89%) con datos sobre su estado hospitalario estaban internados. Edad y pródromo de los pacientes HBoV1+ con y sin co-infección no fueron significativamente diferentes.

Conclusiones. HBoV1 es un virus frecuente en lactantes hospitalizados con IRA en Salta, con estacionalidad en los meses fríos. Los datos aportan evidencias sobre el rol patogénico de HBoV1 en niños pequeños.

2027

Autores: MARIOJOULS J., GUTIERREZ L., URFALÍAN M., CHUMACERO P., BORDA M., CANNA F., BARBÁS M., CUDOLÁ A.

SEROPREVALENCIA DE ANTICUERPOS TOTALES ANTI VIRUS DE HEPATITIS A EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE VIH

Introducción: La incidencia de la infección por el Virus de Hepatitis A (VHA) ha disminuido drásticamente en nuestro país. Si bien se observa una disminución en la notificación de casos en todos los grupos de edad, se destaca el desplazamiento de casos confirmados hacia los grupos de mayor edad (15 a 44 años). La población infectada con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y que es susceptible al VHA, posee mayor riesgo de complicaciones a partir de esta co-infección, pero no hay mayor información de esta seroprevalencia. **Objetivos:** Determinar la seroprevalencia de anticuerpos totales anti VHA en muestras de suero de pacientes con diagnóstico de VIH.

Pacientes y Métodos: Durante el período 2015-2016 se estudiaron 318 muestras de suero de pacientes con diagnóstico de VIH, derivadas al Laboratorio Central de Córdoba para determinar anticuerpos totales anti VHA. Metodologías utilizadas: quimioluminiscencia (Architect i2000, Abbott), y ELISA (Biokit y Dia.Pro). Estudio transversal y anónimo no vinculante.

Resultados: El 68.87% de las muestras estudiadas correspondieron a pacientes del sexo masculino y 31.13% al sexo femenino. De las 318 muestras, 237 (74.53%) resultaron reactivas para anticuerpos anti VHA y 81 (25.47%) no reactivas. Se agruparon según rango etario obteniendo la siguiente prevalencia: 14 a 23 años (58.06%), 24 a 33 años (61.74%), 34 a 43 años (77.22%), 44 a 53 años (93.33%), 54 a 63 años (92%), 64 a 72 años (100%).

Conclusión: Los resultados obtenidos reflejan que existe un 25.47% de pacientes susceptibles a la infección por VHA, siendo los grupos de 14 a 33 años los de mayor impacto. Según recomendaciones de la OMS con respecto a la inmunización de pacientes inmunocomprometidos, se esperaba encontrar un mayor nivel de cobertura contra el VHA.

2028

Autores: HUERGO J., MORELLO A., SEPLOVICH J., VALERIO Y.
Escuela de Nutrición, FCM, UNC.

CONCEPCIONES DE AGROECOLOGÍA Y PROCESO DE TRANSICIÓN DE PRODUCTORES DE LA FERIA AGROECOLÓGICA DE CÓRDOBA

Introducción: La producción de alimentos ha sido transformada durante las últimas décadas como consecuencia de la revolución verde; poniendo en duda su “efectiva” contribución a la solución de la crisis alimentaria global. Como respuesta alternativa surge la agroecología. En la capital cordobesa, comienza a visibilizarse con el surgimiento de la primera Feria Agroecológica de Córdoba (FAC).

Objetivo: Analizar la concepción de agroecología de los productores hortícolas que participan en la FAC y su repercusión en la transición hacia prácticas productivas alternativas, desde el inicio de sus actividades hasta enero del año 2017.

Diseño: Enfoque cualitativo. Universo: productores hortícolas en transición agroecológica que participan de la FAC (N=4). Además, una muestra intencional de informantes claves.

Resultados: El proceso de transición moldeó las propias concepciones de agroecología de los productores y, a su vez, éstas dotan de sentido a sus prácticas productivas. Los factores favorecedores de la transición son: Apoyo institucional, social y el brindado por la FAC. Los obstaculizadores: Discontinuidad de políticas públicas en el campo agroalimentario y ausencia de consumidores conscientes agrupados colectivamente que demanden alimentos agroecológicos, falta de acceso a los bienes naturales y diferente rendimiento con respecto a la producción convencional.

Conclusión: Los productores que atraviesan el primer tiempo del proceso de transición conciben a la agroecología como un método productivo, mientras los que están más avanzados han logrado entenderla como una filosofía de vida. Todos coinciden que les permite vivir en armonía con la Madre Tierra y con su propio cuerpo.

2036

Autores: SIUFI DAGUM Y., CRIVELLI V., GALLI S., TUMAS N., POU S.

LOS GRADIENTES URBANOS DE LA TRANSICIÓN NUTRICIONAL EN ARGENTINA EN EL PERÍODO 2005-2013

Introducción: Es reconocida la influencia de la urbanización en la transición nutricional (TN), entendida ésta como un proceso de cambios en el perfil nutricional de las poblaciones determinado por los patrones de alimentación y actividad física. En Argentina este proceso ha acontecido en el marco de un acelerado proceso de urbanización.

Objetivo: Determinar si existen diferencias significativas en la prevalencia de indicadores seleccionados de TN según grado de urbanización en provincias argentinas, 2005-2013.

Material y métodos: Estudio ecológico multi-grupal (23 provincias y CABA). A partir de encuestas de salud oficiales se obtuvieron indicadores provinciales de TN (estado nutricional, actividad física, alimentación). Se calculó la media de cada indicador según la distribución de las provincias por cuartiles del indicador % de viviendas urbanas. Se realizó un test de diferencia de medias entre las provincias del cuartil superior e inferior de urbanización; se valoró su correlación con los indicadores de TN.

Resultados: La mayor prevalencia de obesidad en niños (10,9%) y adultos (19,4%) se observó en las provincias más urbanizadas. Las provincias con mayor % de viviendas urbanas (cuartil superior) presentaron mayores prevalencias de uso de computadoras, consumo frecuente de sal e ingesta diaria de al menos 5 porciones de frutas y verduras ($p < 0,05$), existiendo tendencia creciente (correlación positiva) entre estos indicadores y el grado de urbanización ($p < 0,05$).

Conclusiones: La urbanización podría explicar, en parte, algunas divergencias geográficas en el perfil alimentario-nutricional de las provincias argentinas. Se recomienda indagar la influencia de otros factores en la configuración de estos fenómenos demográficos y de salud.

2038

Autores: ALECHA G., BUSTOS D., HUERGO J.

CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LOS SENTIDOS: APROXIMACIONES A LA MATRIZ SOCIO-PERCEPTIVA QUE COMANDA LA ACEPTABILIDAD ALIMENTARIA

Introducción: La acción de comer transmite a los sujetos una doble condición: existencia social y situación de ser biológico. Constituye un acto complejo cargado de significados y simbolismos vivenciado en/por el cuerpo.

Objetivo: Analizar la configuración de la matriz socio-perceptiva que comanda el proceso sensorial de aceptabilidad de un alimento/comida en el caso de determinados comensales de la Ciudad de Córdoba, Argentina, acorde a la temporalidad de sus historias de vida.

Material y método: Diseño cualitativo basado en el paradigma interpretativista, planificado en tres etapas: 1) Enseño Dirigido y Cuaderno de Notas emotivas; 2) Entrevista individual semi-estructurada; 3) Encuentro para degustar. Muestra intencional (n: 5), criterios de inclusión: mayoría de edad, relaciones disímiles con los alimentos y disponibilidad de tiempo.

Resultados: Las personas habitamos universos sensoriales diferentes, contruidos en el correr de nuestras historias de vida. La matriz socio-perceptiva recorre todo cuerpo, manteniendo especial relación con las sensibilidades, constituyendo al mismo tiempo, su puerta de entrada. Cada individuo construye una gramática culinaria particular, que define alimentos “con” y “sin” historia.

Conclusiones: El análisis de la alimentación no puede escindirse del territorio corporal; entendido como una trama biológica, sensible e inter-accional. Cada participante le imprimió a sus alimentos emocionalidad y saberes propios de su historia de vida (familia, amigos y paso por universidad).

2045

Autores: SCRUZZI G., FRANCHINI G., TUMAS N., VILLAFAÑE H., ZACHETTI M., CEBREIRO C., ROCAMUNDI M., ULLOQUE J., RODRIGUEZ M., RODRIGUEZ JUNYENT C.

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA E INTERDISCIPLINA: APOR- TES A PARTIR DE UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE EN SALUD

Introducción: La investigación acción participativa (IAP) es un método de investigación y aprendizaje colectivo, basado en un análisis crítico, con participación activa de los involucrados, orientado a estimular el cambio social. En el marco de una experiencia de IAP, un grupo de docentes universitarios elabora una propuesta interdisciplinaria de aprendizaje situado para estudiantes de carreras de salud, a través de actividades que impliquen la construcción conjunta de acciones para abordar complejas realidades sociales.

Objetivos: Empoderar a familias y cuidadores de niños escolarizados de Barrio el Chingolo, a ejercer su derecho a la salud y Afianzar los conocimientos y competencias profesionales de alumnos de carreras de salud de la Universidad Católica de Córdoba, incrementando su sensibilidad y compromiso social.

Métodos: A través de grupos focales se efectuó un análisis de las problemáticas sentidas por la comunidad. Posteriormente, mediante la metodología de taller como espacio de encuentro, se desarrollaron temáticas de elaboración de juegos didácticos, higiene y alimentación. Simultáneamente se reflexionó con los estudiantes conceptos de derechos, salud, pobreza, desarrollo.

Resultados: Participaron 12 docentes, 6 profesionales de salud y 150 familias, se conformó una mesa de diálogo con todos los actores, en la cual se problematizaron las necesidades de la comunidad. En los alumnos se afianzó la formación en conocimientos y competencias propias de la disciplina y el desarrollo de la responsabilidad social.

Conclusiones: La IAP permitió articular acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de la comunidad, y simultáneamente contribuir a la formación de los alumnos, mediante una experiencia interdisciplinaria de intervención en contextos reales.

CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE ALIMENTACION INFANTIL DE CUIDADORES DE NIÑOS PEQUEÑOS

Introducción: Considerando que el cuidado proporciona subsistencia, bienestar y desarrollo a lo largo de toda la vida, y constituye un determinante del estado nutricional (EN), resulta necesario conocer los conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) sobre alimentación infantil (AI) de los cuidadores de niños pequeños.

Objetivo: Analizar la relación entre el EN de niños de 2 a 4 años que asisten al Centro de Cuidado Infantil de Monte Cristo, y los CAP sobre AI de sus cuidadores en el año 2015.

Material y método: Estudio observacional, correlacional de corte transversal. Se valoró el EN de 40 niños de 2 a 4 años y los CAP sobre AI de sus cuidadores. Se analizó la asociación entre los CAP de los cuidadores y el EN de los niños mediante test de Chi cuadrado. Complementariamente se analizó si existieron diferencias significativas algunas prácticas alimentarias según el EN, mediante test T. NC 95%.

Resultados: El 45% de los niños fueron normonutridos, 20% tuvieron malnutrición por déficit y 35% malnutrición por exceso. Comparando los CAP según el EN de los niños (normonutridos/malnutridos), se observó una mayor proporción de cuidadores de niños normonutridos con conocimientos (50%), actitudes (78%) y practicas (55%) adecuados que en aquellos de niños malnutridos (27%; 45% y 27% respectivamente). Se encontró asociación entre las prácticas alimentarias y EN ($p=0,006$), la duración media de lactancia materna fue significativamente mayor en niños normonutridos que en aquellos con malnutrición por exceso (16 meses vs 8 meses) ($p=0,017$).

Conclusiones: Dada la asociación existente entre el EN de los niños y las prácticas alimentarias de sus cuidadores, resulta fundamental apoyar estas prácticas favorables desde edades tempranas.

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS DE CENTROS DE SALUD ACERCA DE DISTANCIAS RECORRIDAS. CONCEPCIÓN DEL URUGUAY

En el marco del PID “Accesibilidad Geográfica a los servicios públicos de salud en del Uruguay” se realizó este estudio sobre la percepción de la distancia recorrida por los usuarios de dichos servicios. El mismo ha sido publicado en G/EA, Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, 2016.

Se propuso analizar la relación entre la percepción de las distancias recorridas por los usuarios de los CAPS para llegar a los mismos y las distancias efectivas.

Se utilizó un diseño transversal de encuesta, se construyó una muestra probabilística estratificada de afijación proporcional con selección aleatoria de casos. Se georreferenciaron los datos y se calcularon las distancias recorridas utilizando la métrica de Minkowski. Luego se llevó a cabo un análisis estadístico correlacional de los datos.

Se halló que la distancia media recorrida por los usuarios desde su domicilio hasta los CAPS fue de 506 m. El valor obtenido para el coeficiente de correlación indicaría una relación entre ambas variables de moderada a fuerte. Los usuarios consideran como “muy cerca” el tener que recorrer menos de 500 m para llegar a los CAPS, como “Cerca” el recorrer entre 500 m y 1000 m, “ni muy cerca ni muy lejos” transitar distancias entre 1000 m y 1500 m y como “lejos” y “muy lejos” el recorrer distancias superiores a los 1500 m. Este hallazgo resulta relevante para la planificación del sistema sanitario a nivel local.

2050

Autores: DÁVILA A., ZARATE J., ILLANES PASSERA M., HUNZIKER C., SANCHEZ C., FORTUNATO M., COPPARI J., PLANTÉ J., COMAS H., FRAGUEIRO A., LORENZON L., SALVADOR S., IUDICELLO M.

FORMACIÓN DE LOS PSICÓLOGOS EN CONSONANCIA CON LAS LEYES DE SALUD MENTAL

Introducción: La Organización Panamericana de la Salud (2009) plantea estrategias y un plan de acción, para un periodo de 10 años, en materia de Salud Mental para las Américas. Entre ellos plantea la formulación y ejecución de políticas públicas, leyes, promoción y prevención en Salud Mental, así como el fortalecimiento en la formación de recursos humanos. En Argentina desde el año 2010 contamos con las Leyes N° 26657 y la N° 9848. Ambas plantean un cambio de paradigma y un desafío en el campo de la Salud Mental.

Objetivo: Describir la adecuación de la formación de los psicólogos a las leyes de SM.

Metodología: Estudio de tipo cualitativo con técnicas de recolección de datos de índole documental y entrevistas a docentes y autoridades. La muestra fue de tipo intencional no probabilística. Las dimensiones de análisis correspondieron a las Recomendaciones para las universidades (CONISMA).

Resultados: Podríamos señalar que es importante el desconocimiento de la Ley por parte de los entrevistados. En general todos coinciden en el rechazo a la internación prolongada y resaltan la consideración de la preservación de los Derechos Humanos. La mayoría piensa que son “otras materias” las que deberían abordar el tema. Cuesta pensar la inclusión de las temáticas de las Recomendaciones en sus asignaturas, como así también las competencias que deberían adquirir los alumnos de psicología.

Discusión: Existe compromiso por parte de las autoridades para implementar cambios. Si bien no podríamos generalizar los resultados obtenidos, esta muestra nos indica la necesidad de capacitación en las Leyes. Es necesario un cambio en los programas, donde se incluya el trabajo interdisciplinario, intersectorial, una perspectiva de salud pública, derechos humanos e inclusión social.

2053

Autores: BHON J., OLIVERA M., RIVERO M., POUS L., TORANZO H., VERDUGO R., TALIA J.

SCREENING POBLACIONAL PARA DIAGNOSTICO DE CHAGAS POR SEROKITS EN EL PERIODO 2016

La enfermedad de Chagas representa uno de los graves problemas de Salud Pública en América Latina, con alto impacto socio-económico al afectar mayoritariamente a sectores vulnerables. La serología es una herramienta fundamental para el diagnóstico de Chagas y el Screening poblacional permite la concreción de datos epidemiológicos sobre prevalencia e incidencia de casos. Presentar y analizar los datos obtenidos mediante el uso de Serokits, a partir de muestras que se recolectaron durante el año 2016, por punciones capilares y provenientes de diversas localidades de la provincia de San Luis. Recolección de sangre capilar y conservación en glicerina (Serokit), instrumento serológico que permite la conservación de anticuerpos y antígenos, en sangre entera capilar, de muestras provenientes de diferentes localidades del interior de la provincia, recogidas y coordinadas en Establecimientos Educativos. Posteriormente mediante las técnicas de HAI y ELISA se re-analizaron las muestras positivas del Screening, tal como lo indica la norma vigente. A la semana 52 del año 2016 la Coordinación Control de Vectores, ha entregado al LSP para su procesamiento, un total de 2115 muestras de sangre capilar, resultando de estas 4 muestras positivas. Estas muestras de pacientes seropositivos fueron confirmadas por par serológico dando 3 de ellas positivas y 1 negativa. Los resultados representan el 0,2 % de las muestras estudiadas. Si bien la seroprevalencia obtenida es baja, resulta necesaria la búsqueda activa en niños y la realización de estos estudios poblacionales. Principalmente debido a que la enfermedad, tanto en el nacimiento como en la niñez es asintomática, y más aún, cuando el diagnóstico y tratamiento temprano en los niños asegura el 100% de éxito.

TENDENCIAS DE EXCESO DE PESO EN NIÑOS DE SAN SALVADOR DE JUJUY, 1996 A 2015

Introducción: El aumento de la prevalencia de malnutrición por exceso ha generado gran preocupación en el ámbito de salud pública por constituir un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, como las cardiovasculares, que representan la principal causa de muerte en nuestro país y en el mundo.

Objetivos: Analizar las tendencias de exceso de peso (EP) en niños de 4 a 7 años entre 1996 y 2015; y determinar la concordancia entre las prevalencias obtenidas en base a dos referencias internacionales (OMS e IOTF).

Material y métodos: Estudio descriptivo, análisis longitudinal. Se calcularon las prevalencias de sobrepeso (SP) y obesidad (OB) según OMS e IOTF y sus intervalos de confianza del 95%, para los periodos 1996-2001; 2001-2005; 2006-2010 y 2011-2015. Se establecieron diferencias entre prevalencias y la concordancia entre OMS e IOTF, con índice kappa.

Resultados: Independientemente de la referencia utilizada, se registraron prevalencias de EP muy elevadas que oscilaron entre 20% y 35% en todo el periodo. Se observaron mayores prevalencias con referencia OMS. Se encontró una buena concordancia entre IOTF y OMS (Kappa = 0,61). Se observó una tendencia ascendente en la prevalencia de EP, de 29,9% (OMS) y 20,1% (IOTF) en el periodo 1996-2000 a 36,55% y 28,87%, respectivamente, en el último periodo (2011-2015). Las diferencias en las prevalencias de EP entre esos periodos con ambas referencias fueron significativas.

Discusión: Se observa una tendencia ascendente de EP independientemente de la referencia utilizada. Entre 1996 y 2015, la OB presenta un aumento significativo en niños de 4 a 7 años, situación sumamente preocupante, considerando que existen mayores probabilidades de que estos niños desencadenen enfermedades crónicas en edades tempranas de la vida.

CALIDAD NUTRICIONAL DE LA MERIENDA ESCOLAR EN UNA ESCUELA PÚBLICA DE CÓRDOBA, ARGENTINA

En los últimos años se han dado cambios adversos en la calidad nutricional de la alimentación infantil tanto en los hogares como en el ámbito escolar. Dichos cambios, influyen no solo en el adecuado crecimiento y desarrollo de los niños, sino también en la prevención de enfermedades del adulto. Este estudio se centró en conocer cuál es la calidad nutricional de la merienda escolar en una escuela pública de San Basilio, Córdoba. El universo lo conformaron 118 niños de 4° y 5° grado de ambos turnos y la muestra 112 niños que cumplieron los criterios de inclusión. A través de una encuesta se registró el consumo de alimentos y datos antropométricos, mediante una técnica observacional se registraron los alimentos del kiosco escolar. La calidad nutricional de los alimentos del kiosco escolar fue no saludable en un 86%, hallándose 97% de alimentos ultra procesados. A su vez 88% de los alimentos consumidos fueron no saludables y 95% ultra procesados. Las meriendas provinieron de fuera de la escuela en un 51%, hallándose asociación entre procedencia de la merienda y calidad nutricional de los alimentos ($p=0,098$) y existió 2,5 veces más chance de presentar alimentos de calidad nutricional adecuada o medianamente adecuada cuando la merienda provino del kiosco vs. Fuera de la escuela ($OR=2,51$). Por otro lado 80% de las meriendas tuvo aporte energético inadecuado, hallándose asociación entre edad y adecuación energética de la merienda al RDE ($p=0,031$). El 94% de las meriendas escolares tuvieron calidad nutricional global no saludable demostrando una práctica de alimentación poco saludable en los niños que será necesario profundizar en futuras investigaciones relación a aspectos sociales, culturales, educativos y simbólicos para luego generar cambios que perduren en el tiempo.

2065

Autores: MEJIA C., MOLINA D., ZAPATA L., ARANGO J.

PARTO DESHUMANIZADO VIVIDO POR LAS MUJERES EN SERVICIOS DE SALUD DE LA RED PÚBLICA MEDELLIN

Introducción: El nacimiento puede ser contemplado en nuestra cotidianidad como un evento que se enmarca en el plano de lo natural. Acudimos a la noción de que las mujeres tienen la capacidad de reproducirse, sin embargo, las prácticas utilizadas en el alumbramiento no suelen ser siempre objeto de cuestionamiento y pueden sugerir la necesidad de las mujeres por obtener intervención experta. Pero si comprendemos el parto como un fenómeno bio-cultural en donde se construyen diversas formas de representarlo, el modelo de atención y la praxis quedan sujetos a un tiempo y contexto específicos de cada sociedad. Así se han registrado en el mundo diferentes formas de vivenciar y atender el parto.

Objetivo: Describir la experiencia vivida de las mujeres sobre la atención recibida por parte del personal asistencial en el parto.

Metodología: Estudio cualitativo (Teoría fundada), muestra 18 mujeres mayores de 14 años, entre 40 días y seis meses postparto, muestreo por conveniencia hasta llegar a la saturación de las categorías. Se realizaron entrevistas semi-estructuradas en tres fases, analizadas línea por línea, utilizando técnicas de codificación y categorización.

Resultados: Las madres describieron la experiencia del parto de forma negativa y lo percibieron en situaciones como la imposición del estoicismo, es decir, reprimir sus emociones y preferir una actitud de sometimiento frente al personal de salud y evocaron de manera crítica la asistencia recibida traducida en maltrato verbal, psicológico y con los procedimientos.

Conclusión. Las madres asignan significados a sus vivencias del proceso de parto no tanto como una experiencia humana trascendente, sino más bien como una supervivencia a la deshumanización del dar a luz en el contexto biomédico.

2066

Autores: CALVO D., PETRI M.

Cobertura Universal de Salud - Sumar, Córdoba, Argentina

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS EFECTIVOS DEL PROCESO DE SCREENING PARA CÁNCER CÉRVICO UTERINO

Introducción: En el año 2012 el gobierno nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación, puso en marcha el programa SUMAR, ampliación del plan NACER. El Programa brinda cobertura a la población de 0 a 64 años. Dentro de los objetivos relacionados a la salud de la mujer busca mejorar el cuidado integral, promoviendo controles ginecológicos preventivos para reducir las muertes por cáncer cervico-uterino. A nivel provincial el sistema de información del programa para tamizaje, está basado en registros manuales lo que ocasiona problemas de identificación de las muestras, pérdidas o roturas, retraso en la comunicación de resultados impidiendo un diagnóstico, seguimiento y tratamiento oportuno.

Objetivo: Optimizar el proceso de obtención de resultados de las muestras de Papanicolaou mediante la implementación de un sistema informático (SIGIPSA)

Metodología: Estudio Cuasi experimental, antes y después, no controlado. La población fueron mujeres mayores a 25 años atendidas en el control ginecológico, entre noviembre 2015 a abril 2016 en centros de atención primaria de la provincia. Implementación de SIGIPSA en dos centros y en un laboratorio de referencia.

Resultados: Implementando SIGIPSA se logró disminuir los tiempos del proceso entre toma de PAP, lectura de muestra y entrega de resultado al profesional y luego a la mujer.

Conclusión: La implementación de un sistema informático permitiría llevar el registro de los procedimientos, integrando una red, facilitando el seguimiento de las mujeres en las distintas etapas del proceso de atención.

PREVALENCIA DE CARIES DENTAL EN NIÑOS ESCOLARIZADOS DE LA LOCALIDAD DE TANCACHA, CORDOBA

Introducción: En Noviembre de 2016 se desarrolló un proyecto de promoción y prevención de la salud, en las escuelas primarias públicas Santiago Ramón y Cajal, Gral. José de San Martín y Gral. Paz de la localidad de Tancacha, provincia de Córdoba. El tamaño de la población y el beneficio de la plena escolaridad, permiten realizar un relevamiento certero, con el propósito de tener una proyección a los fines de desarrollar políticas públicas aplicadas puntualmente a las necesidades de la población.

Objetivo: Determinar la prevalencia de la enfermedad caries en niños de 5 a 7 años, que concurren al primer grado de las escuelas públicas de la localidad de Tancacha, Córdoba.

Metodología: Se realizó Historia Clínica a 98 niños que corresponden al grupo etario de 5-7 años, que concurren al primer grado. Se realizó examen clínico bucal a través de inspección visual táctil, mediante espejo y explorador, a luz natural. Se aplicó el índice CPOD y CEOD (Klein, Palmer, Knutson, 1938; OMS 1997). Se determinaron los valores de prevalencia de la patología a través de la determinación de la media CPOD y CEOD y distribución de frecuencias CPOD-CEOD=0 y ≥ 1 .

Resultados: El valor CEOD fue de 5,25, y la prevalencia de caries fue de 55,4 %. Para el mismo grupo el valor CPOD fue de 1,1, prevalencia de caries moderada (niños no afectados por caries < 5 -20%).

Conclusiones: Los resultados revelan un alto nivel de prevalencia de caries dental en la dentición temporaria, que difiere respecto a las metas propuestas por la FDI/OMS. En tanto la prevalencia de caries para la dentición permanente es moderada. Los datos obtenidos permitieron valorar el estado de salud de la población para planificar estrategias de atención principalmente con un enfoque preventivo y de promoción de la salud bucal.

ESTADO NUTRICIONAL DE NIÑOS Y SU RELACIÓN CON ANTECEDENTES PERINATALES Y NIVEL SOCIOECONÓMICO FAMILIAR. CÓRDOBA

Introducción: el bajo peso al nacer (BPN), el nacimiento pre-término y el nivel socioeconómico familiar (NSE) bajo, estarían relacionados con el desarrollo de estados de malnutrición por exceso, como el sobrepeso y obesidad en la infancia.

Objetivo: evaluar el estado nutricional de niños que asisten a sexto grado de escuelas primarias municipales de la ciudad de Córdoba, en relación a sus antecedentes perinatales y NSE familiar en el año 2016.

Material y método: se realizó un estudio observacional, descriptivo, correlacional, transversal. La muestra estuvo constituida por n=405 niños de ambos sexos, que asistieron al sexto grado de 10 escuelas primarias municipales de la ciudad de Córdoba en 2016. Las variables fueron edad, sexo, estado nutricional, peso al nacer (PN), edad gestacional (EG) y NSE familiar; valoradas mediante cuestionario administrado a padres y niños, y antropometría a niños. Se realizó la prueba estadística de Chi Cuadrado χ^2 con valor de $\alpha=0,05$, y el coeficiente de correlación de Pearson R para conocer la asociación entre las variables.

Resultados: del total de niños, el 48% presentó estado nutricional normal, y el 44,7% presentó exceso de peso, del cual el 25,9% tuvo obesidad y el 18,8% sobrepeso. El 10% de niños bajo estudio tuvo BPN y el 20% nació pre-término. Tuvieron exceso de peso el 61,1% de los niños con BPN y el 42,6% de nacidos normopeso ($p=0,07$). El exceso de peso fue de 32,5% entre los que nacieron pre-término y 48,8% entre los nacidos a término ($p=0,43$).

En todas las categorías de NSE familiar, se encontró que más del 40% de los niños presentó exceso de peso.

Conclusión: el BPN, la EG pre-término y el NSE familiar bajo fue frecuente en niños con sobrepeso y/u obesidad, aunque no se halló asociación estadísticamente significativa.

2071

Autores: CEBREIRO C., RODRIGUEZ JUNYENT C., BALOSSINO P., FERNANDEZ V.

PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y DE CUIDADOS DE SALUD BUCAL EN PREESCOLARES, CÓRDOBA, 2016

Introducción: La salud de un niño está íntimamente relacionada con una adecuada nutrición, por lo que la formación de buenos hábitos alimentarios desde el comienzo de la vida, debe ir acompañado de estilos de vida saludables como la formación de buenos hábitos de higiene bucal.

Objetivo: Determinar las prácticas alimentarias cariogénicas y de cuidado de salud bucal en niños de 2 a 5 años que asisten a jardines de infantes públicos de un Barrio urbano marginal, Córdoba, 2016.

Material y Método: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal. Se valoró prácticas alimentarias cariogénicas y de cuidado de salud bucal (uso y frecuencia de uso del cepillo dental, frecuencia de cambio de cepillo dental, presencia de caries, frecuencia de atención odontológica) en 83 niños en edad preescolar. Se realizó un cuestionario auto administrado a padres, con previo consentimiento informado.

Resultados: Más del 50% de niños y niñas consumen alimentos cariogénicos diariamente. El 80% de niños y niñas se cepillan los dientes entre 1 y 2 veces al día. El 35% de los niños y niñas acuden al odontólogo dos veces al año o más. El 51% de los niños y niñas de 2-3 años asisten una vez al año o menos, y el 81% asisten dos veces al año o más. El 42% de los niños y niñas cambian su cepillo, según lo recomendado por los odontólogos, cada 3 meses. El 67% de los niños de 4 y 5 años tienen o han tenido caries, mientras que las niñas de la misma edad el 50% tienen o han tenido caries.

Conclusión: Es oportuno destacar la importancia de la promoción de la salud y la educación alimentaria nutricional haciendo hincapié en la disminución del consumo de golosinas, jugos y gaseosas en niños, para prevenir el riesgo de padecer patologías crónicas como así también patologías bucales.

2074

Autores: RESTOVICH G., BRESSAN E., MÍAS C., BASTIDA M.

INCIDENCIA DE HÁBITOS RELACIONADOS AL ESTILO DE VIDA EN EL ESTADO COGNITIVO DE ADULTOS MAYORES

Introducción: Diversos estudios sugieren la existencia de hábitos relacionados al estilo de vida que actúan como factores de riesgo o protectores del estado cognitivo. Sin embargo, existen distintas variables que dificultan resultados concluyentes. Identificar hábitos de riesgo en la población local significaría un aporte a la prevención en salud pública.

Objetivos: 1. Analizar la relación de hábitos relacionados al estilo de vida, con el estado cognitivo en adultos de 45-75 años. 2. Explorar componentes de riesgo de deterioro cognitivo considerando variables relacionadas a los hábitos de la vida diaria. **Material y método.**

Tipo de estudio: transversal ex post facto. **Población:** Concurrentes a un Servicio Público de Evaluación Neurocognitiva. **Muestra:** accidental de 810 participantes (49% de la población total) valorados entre 2014-2016, en el Servicio de Neuropsicología, Fac. de Psicología, UNC. Normales (n=387) y con deterioro cognitivo (n=423); edad promedio 67,7 años. **Instrumentos:** Anamnesis, valoración neurocognitiva y cuestionarios conductuales. **Estadísticos:** Prueba U de Mann-Whitney. Análisis de regresión con prueba de bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow.

Resultados. En relación al estado cognitivo normal-deterioro leve, se encontraron diferencias significativas en los hábitos lectura ($p<0,01$), socializar ($p<0,01$), actividad física ($p<0,01$) y problemas para dormir ($p<0,014$). Resultaron factores protectores el hábito lectura (OR=0,74) y socializar (OR=0,67).

Conclusión. Se encontraron hábitos asociados al estado cognitivo de normalidad, como socializar, lectura actividad física y dormir bien; en comparación a las personas con deterioro cognitivo. Mantener los hábitos de lectura y de socializar, implican una significativa reducción de las posibilidades de riesgo de deterioro.

2075

Autores: LIZZI R., PAEZ G., PIRAN ARCE M.
 Departamento de Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud, UNSL.

REDUCCIÓN DE PREVALENCIA E INCIDENCIA DE GASTROENTERITIS EN LA POBLACIÓN DEL VOLCÁN, SAN LUIS, 2017

Fundamentación: Al visitar la localidad El Volcán, se determinó que existe gran prevalencia e incidencia de Gastroenteritis, enfermedad que afecta a todos los grupos etarios de la población. Los factores más relevantes que desencadenan esta patología son el inadecuado tratamiento del agua y la impropia eliminación de excretas. Es importante para la salud pública intervenir, promoviendo la solución del problema de base, formando redes que permitan trabajar sobre las causas, a fin de disminuir el riesgo en la salud de la población.

Objetivo: Reducir la prevalencia e incidencia de gastroenteritis en la población de El Volcán, en un periodo de un año, San Luis, Argentina

Material y Método: Tipo de estudio descriptivo, longitudinal y experimental, mediante la aplicación de planificación estratégica en Salud Pública. Se conformaran redes de trabajo con instituciones (públicas y privadas) más la comunidad, con el fin de lograr su empoderamiento en lo referido a la situación sanitaria vigente. Se diseñarán y aplicarán actividades para la solución del problema, tales como: alcanzar una óptima potabilización del agua, promover la finalización de las obras cloacales, fomentar la limpieza de tanques de agua de las viviendas y educar a la comunidad sobre adecuados hábitos de higiene, beneficios del agua segura y manipulación de alimentos. La evaluación constara de indicadores de proceso, resultado e impacto. Se determinará la reducción de las gastroenteritis mediante pruebas comparativas de significación estadística.

2076

Autores: LIZZI R., CHACON I., PIRAN ARCE M.
 Departamento de Nutrición, Facultad de Ciencias de la Salud, UNSL.

RELACIÓN DEL ESTADO METABÓLICO Y HáBITOS ALIMENTARIOS EN DIABÉTICOS TIPO 2 INSULINOREQUIRIENTES, SAN LUIS 2015

Introducción: La adherencia al tratamiento en la diabetes, optimiza la calidad de vida. El incumplimiento del mismo, constituye un factor de riesgo que afecta a la persona y su entorno.

Objetivo: Relacionar estado metabólico y hábitos alimentarios de Diabéticos tipo 2 insulino-requirientes bajo tratamiento, entre 45 y 75 años.

Materiales y métodos: Estudio descriptivo, observacional, transversal y correlacional. Participaron 83 pacientes de ambos sexos entre 45 y 75 años, que asistieron en un periodo de 3 meses a centros públicos y privados. Los hábitos alimentarios se determinaron a través de encuestas. El estado metabólico se determinó mediante los valores de HbA1c. Ambas variables se compararon con las normas de la Asociación Americana de Diabetes. Se relacionaron las variables, aplicando el Test estadístico Eta.

Resultados: Se analizaron 4 indicadores alimentarios que determinaron, que el 66% de los pacientes presentaron hábitos alimentarios medianamente adecuados y el resto inadecuados. El 70% tenían valores inadecuados de HbA1c. La relación HbA1c/hábitos alimentarios según Test Eta (0,7), afirmó que las variables están asociadas.

Conclusión: El estudio demostró que los hábitos alimentarios influyen directamente sobre el control metabólico del paciente, a pesar de estar bajo tratamiento farmacológico, lo que permite sugerir la implementación de programas que permitan el trabajo interdisciplinario y en redes con la comunidad, para optimizar la prevención y el empoderamiento de la población respecto a la patología.

2089

Autores: ASSUM A., MIRANDA A., SERRA S., LUCCA M.

APTITUDES PSICOLINGÜÍSTICAS EN NIÑOS CON DIFICULTADES EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE

Introducción: Las aptitudes psicolingüísticas son predictores del desarrollo lingüístico y la consolidación de los procesos de aprendizaje.

Objetivo: Comparar las aptitudes psicolingüísticas en niños de 6, 7 y 8 años según desarrollo del lenguaje.

Metodología: Estudio transversal analítico. Niños de ambos grupos (n=28) evaluados con la Prueba Test de Illinois de aptitudes psicolingüísticas. **Análisis estadístico:** análisis de frecuencias, estadística descriptiva y comparaciones (prueba t de Student) que evalúa diferencia entre datos obtenidos en los grupos con lenguaje típico (n=10) y atípico (n=18).

Resultados: En el grupo de 6 años, con lenguaje atípico mostraron aptitudes psicolingüísticas significativamente inferiores respecto de aquellos con lenguaje típico a nivel global ($p < 0.001$). En el grupo de 7 años se obtuvieron resultados significativos en la Integración Auditiva ($p < 0,05$). En los niños de 8 años se encontraron diferencias en la Expresión Verbal ($p < 0,05$), Memoria Secuencial Auditiva ($p < 0,05$), Memoria Secuencial Visomotora ($p < 0,05$). Con respecto a las edades psicolingüísticas, se halló diferencia significativa en la muestra de 6 años al compararse según el tipo de desarrollo de lenguaje ($p < 0,001$).

Conclusión: Las características de los niños de 6 años pueden ser consideradas como una etapa transfronteriza válida que demuestra la consolidación de la integridad del lenguaje y las aptitudes involucradas. En edades posteriores los resultados de estas pruebas pueden estar sesgados por las habilidades adquiridas a través del aprendizaje formal.

2095

Autores: ORPHEE C., CRUZ R., SUAREZ R., VALDEZ E., CEQUEIRA C., FUENTES M.

INDICE DE MASA CORPORAL, ACTIVIDAD FISICA Y ALIMENTACION EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Fundamentación: los estudiantes Universitarios tienen un estilo de vida cada vez más sedentario lo que sumado a malos hábitos alimentarios influyen negativamente en su salud. La OMS utiliza y recomienda el índice de masa corporal (IMC) como el indicador más útil de sobrepeso y obesidad con la línea de corte clásico $> 25 \text{ kg/m}^2$ sobrepeso y $> 30 \text{ kg/m}^2$ obesidad.

Objetivos: determinar el Índice de Masa Corporal e identificar los hábitos alimenticios y de actividad física en alumnos universitarios.

Materiales y métodos: se determinó peso y estatura (para el cálculo del IMC) de alumnos de entre 25 y 30 años de ambos sexos, de la carrera de Bioquímica. Las encuestas nutricionales y la actividad física se evaluaron mediante el IPAQ (Cuestionario Internacional de Actividad Física).

Resultados: el cálculo del IMC, demostró que el 52% tiene sobrepeso (dentro de este, el 78% sobrepeso, el 21% obesidad) y un 4% bajo peso. Del análisis de las encuestas se observó que en los últimos siete días el 67% y el 81% no realizan actividades física intensas y moderadas respectivamente, pero un 55% camina diariamente. Más del 60% manifiesta estar sentado de cinco a ocho horas diarias y 39% de 9 a 15 horas. Los alimentos preferidos son embutidos, aderezos, carnes con grasa, alimentos procesados, harinas refinadas, pollo con piel, golosinas, galletitas y caramelos.

Conclusiones: los valores obtenidos en el presente trabajo, demandan acciones correctivas en la conducta alimentaria que moderen la cantidad, y controlen la calidad de los alimentos y sobre todo, instar a realizar actividad física. Desde la Cátedra de Salud Pública se pretende comenzar con Jornadas informativas y de concientización de esta problemática sanitaria que revierta a corto plazo para evitar las patologías asociadas.

2100

Autores: SUDRIA M., DEFAGO M.

PERFIL NUTRICIONAL DE MUJERES EMBARAZADAS PROVENIENTES DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD, PRESIDENCIA ROQUE SÁENZ PEÑA, CHACO

Introducción: el embarazo es una etapa crucial en el ciclo vital, con repercusión en la salud de la mujer embarazada y del niño por nacer.

Objetivo: establecer el perfil nutricional de mujeres embarazadas asistentes al control prenatal en el sector público en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco.

Material y método: participaron 107 mujeres gestantes concurrentes al control prenatal en el Hospital 4 de Junio y 3 centros de salud, durante enero-abril de 2016. Se aplicaron: historia clínica, encuesta alimentaria cuali-cuantitativa validada, medidas antropométricas. Se utilizó el software nutricional Interfood v1.3. Según grupo etario (14-18 años y mayores de 19 años) se analizó el estado nutricional, consumo calórico, proteico, calcio, hierro, suplementos dietarios, prevalencia de enfermedades intercurrentes y derivación al nutricionista. Se utilizó el software estadístico SPSS v21.

Resultados: el 63% presentó normopeso, aunque hubo malnutrición por déficit (10%) y por exceso (27%). Más del 80% presentó un consumo calórico inadecuado por exceso. El consumo de proteínas fue inadecuado por exceso en el 90%, de hierro fue inadecuado por déficit en el 64% y de calcio fue inadecuado por déficit en el 72%. Con respecto a suplementos, el 45% reportó no consumir ácido fólico, el 71% incorporó hierro y el 69% no consumir complejos vitamínicos. Se encontró una correlación positiva estadísticamente significativa entre edad materna y consumo de calcio y proteínas ($r=0,24$, $p=0,01$ y $r=0,19$, $p=0,04$, respectivamente). El 8% presentó diabetes gestacional. La derivación al nutricionista sólo se observó en el 13% de las participantes.

Conclusión: la población bajo estudio presentó un perfil nutricional de riesgo. Se precisa profundizar en el abordaje y seguimiento en esta etapa vital.

2105

Autores: ARAMBURU E., LUQUE L.

DIMENSIONES DE PERSONALIDAD ASOCIADAS A ADICCIONES TECNOLÓGICAS

El uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) es legal y está ampliamente aceptado; sin embargo, algunas personas presentan comportamiento problemáticos y pérdida del control en relación a las TIC (Pedrero Pérez, 2010), lo que define su conducta como adictiva (Echeburrua y Corral, 2009). Si aceptamos la pluricausalidad de los factores externos que favorecen las adicciones, y si entendemos la personalidad como una organización relativamente estable que permite modular la adaptación a la experiencia, es posible hipotetizar que la personalidad es facilitadora de inicio, desarrollo y mantenimiento de un patrón de uso problemático del objeto tecnológico (Schmidt et al, 2010).

El objetivo fue analizar la relación entre dimensiones de personalidad y los patrones de uso de TIC, mediante un estudio descriptivo, transversal, de enfoque cuantitativo, que incluyó a 300 personas de ambos sexos, de 16 a 60 años de edad; la selección fue accidental, no probabilística. Se aplicaron el EPQ-RA validado en Argentina y una escala local de Dependencia psicológica de Tecnologías.

Quienes puntúan alto en el rasgo “extroversión” presentan más usos intensivos de TIC. El rasgo denominado “psicoticismo” se encuentra asociado al patrón de uso de videojuegos, estando más presente el rasgo en videojugadores problemáticos; esta asociación además varía según los rangos evolutivos propuestos por Prensky (2001). El uso del teléfono móvil es el que más se presenta como patológico (adicción) y esto tendría que ver con el uso problemático de internet en tal dispositivo. La falta de asociaciones del rasgo “neuroticismo” podría deberse a la deshabilidad social del grupo estudiado; esto mismo podría explicar la falta de “sinceridad” en el 23.7% de la muestra.

2106

Autores: DEZZOTTI L., EANDI M., BUTINOF M.

EXPOSICIÓN A PLAGUICIDAS: PRÁCTICAS PRODUCTIVAS, REPRODUCTIVAS Y VIDA COTIDIANA DE LAS FAMILIAS HORTÍCOLAS. CÓRDOBA, ARGENTINA

Introducción: El hogar y la quinta son los espacios donde las familias hortícolas (FH), hombres, mujeres, niños y niñas, llevan a cabo sus prácticas productivas y reproductivas, vinculadas con los procesos de exposición a plaguicidas. El modelo productivo vigente, habitus y sistema social de género condicionan el desenvolvimiento de la vida cotidiana, las prácticas y representaciones.

Objetivo: Analizar la relación existente entre prácticas productivas y reproductivas llevadas a cabo por las FH del Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba (CVCC), en el marco de la vida cotidiana, y su vinculación con la exposición ocupacional y no ocupacional a plaguicidas.

Metodología: Estudio cualitativo mediante entrevistas en profundidad a integrantes de FH, observación participante en el Mercado de Abasto de la Ciudad de Córdoba y en la quinta – hogar y notas de campo.

Resultados y conclusiones: En la quinta, lugar de vida de las FH, las prácticas productivas y reproductivas se relacionan de manera indivisible; hombres y mujeres se apropian material y simbólicamente de los espacios físicos y las actividades que estos requieren. Ambos participan en menor medida en las áreas no asignadas socialmente, aunque estas actividades sean invisibilizadas. Las tareas vinculadas con las buenas prácticas de horticultura (BPH) son asignadas al hombre, aun cuando hombres y mujeres trabajen en la huerta. Las relacionadas con el hogar, principalmente a la mujer madre; estas tareas modulan los procesos de exposición a plaguicidas. La exposición dietética, de potencial riesgo para la salud de las FH, no es reconocida como tal. La indivisibilidad hogar-quinta generan un continuum para la vida cotidiana y la exposición; las FH se encuentran expuestas a plaguicidas ocupacional y no ocupacionalmente.

2111

Autores: CAMPUSANO M., SUDRIÁ M.

PERFIL DE LOS LACTANTES QUE ASISTEN A CONTROL DE NIÑO SANO

Introducción: La OMS ha insistido en la promoción de la Lactancia Materna Exclusiva (LME) durante los primeros 6 meses. El abandono precoz de la LME constituye un riesgo potencial para desarrollar un sin número de afecciones observadas en los primeros 12 meses de vida. En la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco, se desconoce la información sobre la prevalencia de la LME que existe en la población de niños/as que asiste al servicio de pediatría del Hospital 4 de Junio “Dr. Ramón Carrillo”.

Objetivo: Determinar el perfil de los lactantes de 0 a 12 meses de edad que asisten a control de niño sano en el Hospital 4 de Junio de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, durante los meses de noviembre y diciembre del año 2015.

Método: Se aplicó un modelo de estudio cuantitativo, descriptivo y transversal. Los datos se recopilaron mediante 200 encuestas anónimas, verificadas tras una prueba piloto en 100 niños antes de ser aplicada, dirigidas a los padres o acompañantes y la posterior medición de los niños/as. La tabulación encuestas se realizó a través de un programa estadístico informático IBM SPSS statistic 22. Los datos se analizaron aplicando técnicas referidas a la estadística descriptiva, y se utilizó el test de chi-cuadrado para evaluar asociación.

Resultados: Se realizaron 200 encuestas a los padres/tutores de niños/as de 0 a 12 meses, en donde se determinó que el 55% no realizó LME hasta los 6 meses de edad y de ellos, el 70% presentaba un estado nutricional no adecuado, y el 72,5% presentó algún tipo de enfermedad, como episodios febriles, bronquiolitis, alergias, neumonía, infección urinaria, etc.

Conclusión: “la interrupción de la LME por incorporación temprana de alimentación artificial afecta el estado de salud y nutricional de los niños/as”. La población bajo estudio presento una prevalencia de LME baja, y un abandono de la misma cada vez a edades más tempranas, por motivos aislados a contraindicaciones médicas.

RECUPERANDO EL DERECHO A LA SALUD EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE DEL GRAN MENDOZA

Introducción: Las personas en situación de calle son parte de una problemática global producto de las inequidades sociales, quedando expuestas a una gran vulnerabilidad psico-socio-sanitaria. Es una población heterogénea, con carencia de vínculos sociales y redes familiares. En la provincia de Mendoza el último registro es del año 2013 y se estimaron 4000 personas en esta situación. Alumnos y docentes de la carrera de Medicina de la UN Cuyo decidimos actuar acompañando y acercando a las personas a uno de los principales lugares en donde son excluidos: el sistema de salud, apoyándonos en la APS. **Objetivo:** Mejorar el acceso a la salud de las personas en situación de calle de Mendoza.

Metodología: Junto a otras instituciones se realizaron operativos de salud donde se asistió integralmente a esta población. Se diseñó una historia clínica que contempla los aspectos necesarios para el trabajo con personas en situación de calle. Se creó un consultorio médico-social, la Unidad de APS Itinerante (UAPSI), que cuenta con un equipo interdisciplinario y actúa como puerta de entrada al sistema de salud.

Resultados: Desde el año 2014 se realizaron 10 operativos de salud, donde se asistieron a más de 100 personas en cada uno. En agosto de 2016 se creó la UAPSI, donde se brinda atención integral a más de 160 personas, con más de 850 consultas a la fecha.

Conclusiones: Años de continuo trabajo con esta población y las redes que intervienen nos confirman que la problemática de ésta es sumamente compleja, requiriendo por ende de acciones articuladas intersectoriales para abordar adecuadamente la situación. Las actividades realizadas en la UAPSI y los operativos nos dan una visión más completa, y nos permiten seguir planificando acciones articuladas con el resto de los actores en juego.

EL FARMACÉUTICO EN EL CONTROL DE LOS MEDICAMENTOS DE LOS CARROS DE PARO

Introducción: El carro de paro (CP) es una unidad portátil que contiene el material necesario para una reanimación cardiopulmonar. Dada su importancia es relevante controlar las fechas de caducidad de sus medicamentos (M) para que sean seguros y eficaces, y evitar pérdidas económicas. El Hospital nacional de Clínicas (HNC) dispone de un protocolo para los CP, en el cual se detalla los M, sus cantidades, modalidad de control que es realizado por las farmacéuticas cada 6 meses y su reposición que es a través de una prescripción una vez usado.

Objetivo: analizar las desviaciones en el contenido de los CP en 11 servicios del HNC, luego del control correspondiente.

Materiales y Métodos: Estudio transversal y descriptivo en 1er semestre 2016. Se controlaron M de CP de los servicios del HNC. Se registró en planilla Excel los M: vencidos, a vencer en el siguiente semestre, los que se retiraron por sobre stock y los que se repusieron por falta de stock.

Resultados: se controlaron 11 CP y se revisaron 2014 M, con los siguientes resultados:

Medicamentos Variedades M Unidades M. Por vencer 24 409; Sobre Stock 22 261; Vencidos 13 63; Faltantes 16 47. A pesar de contar con un protocolo, se observaron desviaciones pero solo en las cantidades de los M. Se retiraron por sobre stock un 13% de las unidades y se repuso por faltante un 2%. Un 3% de unidades de M estaban vencidos en 6 CP, a pesar que en el control anterior se dejó previsto que no ocurriera. Se reemplazó el 20% de unidades de M por estar próximos a vencer.

Conclusión: La importancia de disponer rápidamente de M de un CP, para favorecer una atención inmediata, eficiente, ordenada y oportuna del paciente en emergencia cardio-respiratoria, es fundamental que el farmacéutico con los miembros del equipo de salud trabaje para garantizar la disponibilidad de los M.

2118

Autores: GRANDE M., JUÁREZ C., RAMIS M., BRAIDA D., ROMÁN M.

CALIDAD DEL DESAYUNO Y SU ASOCIACIÓN CON EL ESTADO NUTRICIONAL EN ESCOLARES DE CÓRDOBA 2016

Introducción: El desayuno es la primera ingesta del día, que contribuye al rendimiento físico e intelectual a la vez que impacta sobre el balance de la dieta y consecuentemente en el estado nutricional (EN). La omisión del desayuno, o su realización de manera incompleta y/o insuficiente se ha asociado al sobrepeso en niños y adolescentes.

Objetivo: Analizar la composición y el aporte energético del desayuno y su asociación con el EN en escolares de 9 a 12 años de la ciudad de Córdoba, 2016.

Materiales y método: Estudio analítico de corte transversal en una muestra de 221 niños de 4to-6to grado de escuelas primarias. Se utilizó un cuestionario de alimentación validado para conocer el consumo alimentario del día anterior. Se valoró la ingesta de desayuno, composición (completo: fruta, lácteo y cereal; parcialmente completo: lácteo y cereal; incompleto: solo 1 alimento) y aporte energético (suficiente: $\geq 25\%$ del valor energético total; insuficiente $<25\%$). Se evaluó EN según IMC/edad (OMS 2007). Se estimaron OR e intervalos de confianza (95%) ajustando modelos multinivel, estratificados por sexo, para valorar la asociación de la presencia/ausencia de sobrepeso u obesidad con las variables de interés incluidas en el nivel 1, y el tipo de gestión escolar (pública o privada) en el nivel 2.

Resultados: El 96% reportó haber desayunado, aunque se observó un desayuno insuficiente en el 80,7% e incompleto en el 63,2% de la muestra. Solo 1 niño presentó un desayuno completo. En las niñas, el desayuno insuficiente se asoció a la presencia de sobrepeso (OR. 1,55; IC95%1,18– 2,04) y el desayuno incompleto a la presencia de obesidad (OR 1,76; IC95% 1,29 –2,39).

Conclusiones: Un desayuno completo con aporte suficiente de energía puede contribuir al control del sobrepeso y la obesidad en la infancia.

2119

Autores: USÍN M., RODRIGUEZ V., SOLARI N., ROSELLA C., MENSÓ J., TABARES S., SEMBAJ A.

PANORAMA DE LA SALUD GINECOLOGICA Y ORAL DE LAS MUJERES CONCURRENTES AL DISPENSARIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BIALET MASSE, PUNILLA, CORDOBA

Introducción: Las cepas del virus del Papiloma humano (HPV) desarrollan lesiones precancerosas y cáncer de cuello de útero. Hay poca información sobre la incidencia de infestación oral por HPV en nuestra población y su participación en la periodontitis de mujeres con HPV.

Objetivo: Determinar la incidencia de infección por HPV en la población de Bialet Massé y conocer la frecuencia oral del virus.

Material y Métodos: Se realizó un trabajo descriptivo, 1008 pacientes que concurren al consultorio de Ginecología y Obstetricia del Dispensario de Bialet Massé, Punilla, Córdoba. En el año 2010 se iniciaron los exámenes de colposcopia y colpo-citología y se constituyó un equipo multidisciplinario.

Resultados: Se detectó alta precocidad en el inicio de la actividad sexual; tabaquismo, falta de control odontológico y de higiene bucal, varias parejas sexuales; desconocimiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual, etc. Se realizaron, 364 PAP (febrero-diciembre 2010), 64 fueron anormales (17,6%) con confirmación histológica de la infección. Durante el intervalo enero-agosto de 2011 se realizaron 169 PAP y las anormales fueron 36 (21%). Las pacientes con diagnóstico anormal recibieron tratamiento o fueron derivadas a centros de mayor complejidad. 19 pacientes HPV positivas asistieron a una evaluación odontológica y se detectó en 7 de ellas ADN de HPV en la cavidad oral (37%). Cada una proporcionó información acerca de la infección por HPV, sus riesgos y de la importancia de los controles periódicos a su círculo de amistades.

Conclusión: El desconocimiento en la ETS ocasiona una alta incidencia de infecciones orales que sostiene el círculo infecto-contagioso. Se observó que la mejor estrategia para la difusión y promoción de la salud en la comunidad es la comunicación entre amigas.

PREVALENCIA DE DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN UN SERVICIO PÚBLICO DE EVALUACIÓN, Y EL EFECTO MODULADOR DE LA RESERVA COGNITIVA

Introducción: La depresión tiene una elevada comorbilidad con el deterioro cognitivo (DC). La reserva cognitiva (RC) describe los efectos moduladores y protectores del nivel de instrucción y repertorio de habilidades; tiene efecto protector sobre DC.

Objetivos: Describir prevalencia de depresión asociados a DC en un servicio público de neuropsicología; y evaluar los efectos moduladores de la RC y DC en depresión.

Metodología: Exploratorio, comparativo. Población: Concurrentes (N=831) Servicio Neuropsicología UNC; años 2014-2016; edad 64,87 años (DT=11,6) y 69,7% femenino. Instrumentos: Escala Reserva Cognitiva (Rami); Escala Depresión (Yesavage); Estadísticos: Frecuencia (diagnóstico-depresión), test χ^2 , regresión lineal. Resultados: Se encontró un 58% de personas con DC; con depresión ligera 36,3%, moderada 15,9% y severa 10,3%. El test χ^2 indica una asociación significativa entre niveles bajos de RC y depresión ($p=0,000$), en cambio para niveles medios y altos no hay asociación significativa ($p>0,05$). Los ítems de la escala de RC predictivos de depresión son: la escolaridad ($r^2=0,71$; $p=0,000$), escolaridad de padres ($r^2=0,71$; $p=0,000$), ocupación laboral ($r^2=0,71$; $p=0,000$) y realización de juegos intelectuales ($r^2=0,71$; $p=0,007$). Los ítems de RC predictivos de deterioro en personas sin depresión son: escolaridad ($r^2=0,73$; $p=0,000$), escolaridad de padres ($r^2=0,73$; $p=0,001$) y ocupación laboral ($r^2=0,73$; $p=0,000$). Los ítems de RC predictivos de deterioro en personas con depresión son: escolaridad del sujeto ($r^2=0,78$; $p=0,000$), escolaridad de los padres ($r^2=0,78$; $p=0,004$), cursos de formación ($r^2=0,78$; $p=0,002$) y ocupación laboral ($r^2=0,78$; $p=0,002$).

Conclusiones: El presente estudio muestra que la RC ejerce efectos moduladores sobre el estado cognitivo y la depresión.

CONTEXTO FAMILIAR Y ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL DE LAS REGIONES NOA Y PAMPEANA ARGENTINA SEGÚN ENCUESTA NACIONAL DE NUTRICIÓN Y SALUD

Introducción: Los procesos de salud enfermedad, son de gran interés para la medicina social y la salud colectiva latinoamericana. El estado nutricional (EN) es resultante de múltiples factores que operan a distintos niveles de organización individual y poblacional siendo la familia el primer contexto social del niño/a.

Objetivo: Analizar condiciones del contexto familiar de niños/as de 2 a 5 años de las regiones NOA y Pampeana de Argentina y su asociación con el EN según datos de la ENNYS. Material y Método: Estudio observacional, analítico, de corte transversal. Se definieron determinantes sociales de interés de 1305 y 1164 niños/as de ENNyS 2005 en NOA y Pampeana, respectivamente. Se examinó diferencia de proporciones entre regiones para indicadores sociales estudiados. Se analizó su asociación con EN (clasificación OMS 2006) en cada región mediante test Chi-cuadrado.

Resultados: La proporción de familias con jefe de hogar femenino fue mayor ($p<0,001$) en NOA 28,9% (vs 17,6% Pampeana). Nivel de educación del jefe de hogar EGB completo fue más frecuente en Pampeana ($p=0,026$). En ambas regiones el nivel de educación del jefe de hogar se asoció a baja talla infantil ($p=0,021$ Pampeana y $p=0,037$ NOA). En NOA, se encontró asociación entre EN (IMC/edad) y edad del jefe de hogar ($p=0,018$). Asimismo baja talla y obesidad se asociaron a la pertenencia a hogares de más de 6 integrantes ($p=0,045$ y $0,004$ respectivamente) y fue ésta región que presentó mayor proporción de familias con más de 6 integrantes ($p<0,001$).

Conclusión: Identificar simultáneamente determinantes sociales y EN de población infantil Argentina pueden servir como aporte al conocimiento para diseñar intervenciones y/o políticas de salud orientadas a la problemática de nutrición infantil, en sus distintas formas.

2126

Autores: GILOBERT M., ESCALANTE B., ESCALANTE N., FARFAN C., BERTA D., YUGRA V.

Facultad de Ciencias de la Salud. U.N.SA. Servicio de Neonatología Hospital J.D. Perón. Tartagal.

DETECCION DE VIH EN EMBARAZADAS Y TRANSMISION PERINATAL EN TARTAGAL. PROVINCIA DE SALTA. AÑO 2016

Introducción: en Argentina existen los recursos para ampliar la detección de VIH en embarazadas y transmisión perinatal de HIV al momento del nacimiento. La tasa de transmisión perinatal del VIH continúa en descenso, con diferentes realidades en regiones del país. El desafío es cubrir el 15% de las que aún No se realizan el test y la meta de una tasa de transmisión vertical de VIH menor al 2%, requiere de monitoreo permanente, cobertura e intervención eficaz.

Objetivo: evaluar la detección de embarazadas con VIH, transmisión perinatal y cobertura antirretroviral a fin de disminuir las tasas de VIH en embarazadas y recién nacidos en Tartagal.

Material y Método: estudio descriptivo aproximado a una cohorte, durante 2014, 2015 a marzo de 2016, a fin de detectar VIH en embarazadas y recién nacidos, cobertura antirretroviral en el servicio de Neonatología del Hospital de Tartagal. Se analizó mediante estadísticos descriptivos.

Resultados: se detectaron 32 embarazadas con VIH, 78% Con TARV 22% Sin TARV en trabajo de parto y post-parto. El 76% recibió tratamiento endovenoso intra-parto y 24% en las 24 horas. Se observó aumento del 300% de VIH Sin TARV en 2016. Se detectó 25 casos de transmisión perinatal, 65%; 56% en mujeres y 44% en varones. El 76% tratado con una droga, 34% con 2 o más. La cobertura en embarazadas es de 5 controles o más.

Conclusión: los hallazgos muestran alta tasa de VIH Sin TARV en Embarazadas durante el parto e incremento de transmisión perinatal en Tartagal e implica un mayor monitoreo y cobertura del equipo de salud.

2130

Autores: BERTORELLO N., LERDA D., DEFAGO M.

CONSUMO DE ALIMENTOS FUENTE DE OMEGA 3 Y 6 E IMPACTO EN FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN SÍNDROME METABÓLICO: RESULTADOS PRELIMINARES

Introducción: por su participación en procesos inflamatorios, los ácidos grasos (AG) n3 y n6 se asocian positiva o negativamente a factores de riesgo cardiovasculares.

Objetivo: analizar el consumo de alimentos fuente (AF) de AG n3 y n6 en relación a factores de riesgo cardiovasculares en pacientes con síndrome metabólico (SM).

Material y Métodos: participaron 50 adultos, ambos sexos, con diagnóstico de SM, asistentes al Servicio de Cardiología y Clínica Médica de la Clínica Universitaria Reina Fabiola y del Servicio de Cardiología Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba, durante 2015-2017. Se realizaron mediciones antropométricas, presión arterial sistólica (PAS) y diastólica (PAD), determinación de colesterol, LDLc, HDLc y triglicéridos. Se aplicó un cuestionario de frecuencia de consumo alimentario validado. El consumo de AF se categorizó en AF de AG n6: frutos secos (FS), aceites vegetales y margarinas (AcM), carnes y embutidos (CE) y soja (S) y AF de AG n3: pescados (P) y frutos de mar (FM). Se aplicó el test de correlación de Spearman para analizar la relación entre las variables, mediante el software InfoStat.

Resultados: el 90% presentó exceso de peso y el 80% riesgo cardiovascular por circunferencia de cintura. Las medias de PAS y PAD fueron 132,6 y 81,9 mmHg, respectivamente, colesterolemia 210,4 mg/dL, HDLc 43,1 mg%, LDLc 127,8 mg% y trigliceridemia 204,9 mg/dL. En hombres, hubo una asociación positiva estadísticamente significativa entre consumo total de AF de AG n6 y PAS ($r=0.48$, $p=0.01$) y entre ingesta de CE y PAS y PAD ($r=0.52$, $p=0.007$ y $r=0.42$, $p=0.048$, respectivamente).

Conclusión: se observa un posible efecto pro-inflamatorio asociado a ingesta de AF de AG n6. Es preciso profundizar en la relación entre alimentación y factores de riesgo en el SM.

2131

Autores: TORREJON I., MARTIN B., DE LAPUENTE T., CHAGARAY F., TORRES A.

PERFIL LIPÍDICO Y GLUCEMIA EN ESCOLARES RESIDENTES A DIFERENTES ALTURAS DE LA PROVINCIA DE JUJUY

Introducción: Esta demostrada la relación entre las alteraciones del metabolismo lipídico y el riesgo de enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis es un proceso patológico que aparece silenciosamente desde la niñez, por lo tanto es importante estudiar los valores de los factores de riesgo en edad temprana antes de que se establezcan procesos irreversibles. Son escasos los estudios en población infantil de altura.

Objetivo: estimar los valores de los lípidos y glucemia en una población aparentemente sana que asiste a escuelas públicas.

Método: Se estudiaron 300 individuos que asisten a escuelas públicas de valles (1200 msnm) y puna (>3000 msnm). La edad de la población estudiada fue de 5 a 12 años Se solicitó el correspondiente consentimiento informado a los padres. El trabajo fue aprobado por el comité de bioética del Ministerio de Salud. Se dosaron en suero Glicemia (Glu), Colesterol total (CT), Colesterol LDL (LDLc), Colesterol HDL (HDLc), Triglicéridos (Tg), por métodos colorimétricos. Se analizaron diferencias según sexo y altura. Se calcularon medias, desvío estándar y test de student. La dislipemia y glucemia fue definida según ATPIII.

Resultados: La dislipemia en escolares de valles fue 0,96%Tg, y para la Puna fue 0,48%CT. Los valores de HDL fueron superiores en la población de sexo femenina. No se encontraron valores elevados de Glu aunque los mismos fueron más bajos en la Puna ($p < 0.001$).

Conclusiones: si bien las dislipemias encontradas no son elevadas, se observa que desde la niñez ya están presentes, por lo tanto es importante los controles a edad temprana.

2135

Autores: MACLEAN B., DIFILIPPO F., ETCHEGOYEN A., MATURANO E., AVILA-VAZQUEZ M.

ASOCIACIÓN ENTRE ASMA BRONQUIAL Y EXPOSICIÓN A GLIFOSATO EN UN PUEBLO AGRICOLA DE CÓRDOBA

Introducción: Autoridades de Monte Maíz notan un aumento de asma y nos solicitan evaluar prevalencia y sugerir causas.

Objetivo: Determinar si hay aumento de prevalencia de asma y analizar factores ambientales para desarrollar hipótesis de causalidad.

Población: Niños menores de 16 años (n=1174) de los cuales se analizó la franja etárea de 6-7 años (n=164) y de 13-14 (n=143) que constituyen grupo de vigilancia epidemiológica mundial.

Materiales y Métodos: Estudio trasversal de prevalencias de asma (sibilancias y/o uso de broncodilatadores), con georeferenciación y dosaje de pesticidas en muestras ambientales.

Resultados: La región utiliza 650.000 kilos de glifosato (975.000 kg total de pesticidas) que se almacenan en el interior del pueblo, junto con los granos. El estudio químico halló altas y predominantes concentraciones de glifosato en suelo y en cascarillas de maíz y soja (3868 ppb seguido por 337.7 ppb de endosulfan). La tierra del interior del pueblo presenta niveles de glifosato más altos que en los mismos campos de cultivo.

La frecuencia de asma en niños de 13-14 años fue 39,8% y en niños de 6-7 años un 52,4%; al sur del sector ocupado por acopios de granos la prevalencia fue aún mayor. Ciudad de Córdoba (ISAAC fase III 2013) tiene 13,6% de asma en 13 y 14 años, similar en niños de 6-7 años, Monte Maíz mostró una prevalencia más de 3 veces mayor.

Conclusiones: Los niños de Monte Maíz presentan prevalencia de asma muy aumentada con respecto a las tasas globales y de ciudad de Córdoba y alta exposición a pesticidas, sobre todo glifosato; estudios experimentales confirman esta asociación (asma y glifosato o pesticidas y asma), sugerimos disminuir esta exposición para proteger la salud respiratoria de la población.

2139

Autores: BEZZONE N., LUNA L., LODEYRO P., SPAINI L., VIEYTEZ A., TURELLO P., HEREDIA E.

DETERMINANTES SOCIALES Y AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA EN CONTEXTOS DE POBREZA

Introducción: Varios estudios evidencian los costos individuales y sociales atribuibles a la postergación del bienestar de la infancia (Lipina y otros, 2013; Tuñón, 2012; Terra y otros, 1986). El trabajo sobre prácticas de crianza y desarrollo psicomotor del GIEP en Uruguay constituye el principal antecedente de esta investigación (Canetti y otros, 1993; CEPAL, 2014).

Objetivo: Identificar los determinantes sociales y ambientales que constituyen factores de riesgo asociados al desarrollo psicomotor de niños y niñas de 0 a 5 años en contextos de pobreza de la ciudad de Córdoba.

Material y Método: Estudio de corte transversal. Muestra: 240 casos de niños y niñas que asistieron al control del niño sano a las Unidades Primarias de Atención de la Salud de Córdoba (09/2014 a 02/2015). La selección de UPAS se llevó a cabo de manera aleatoria.

Instrumentos de recolección de datos: Cuestionario de evaluación del ambiente familiar, Instrumento de Evaluación de prácticas de crianza y PRUNAPE. Las diferencias de cocientes de desarrollo entre subgrupos se evaluaron con análisis de la varianza; las diferencias en proporciones de prácticas de crianza con pruebas de chi cuadrado.

Resultados: Las principales variables psicosociales asociadas con demoras en el desarrollo son: nivel educativo materno ($p < 0.009$) acostumbra leerle/cantarle ($p < 0.001$) sirven los juegos ($p < 0.006$) autonomía ($p < 0.021$) y decisiones de los padres en educación y salud ($p < 0.022$).

Conclusión: Los determinantes sociales pueden afectar el desarrollo infantil temprano, se han identificado los factores de riesgo más relevantes (consistentes con estudios antecedentes). Se logró sistematizar aspectos de la relación existente entre Desarrollo Infantil, Prácticas de Crianza y Ambiente Familiar.

2140

Autores: JURADO C., COMETTO M., GOMEZ P.

EXPECTATIVAS DE PROFESORES Y ESTUDIANTES EN LA EXPERIENCIA CLINICA DURANTE LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS. 2016

Introducción: El complejo campo de la salud y la educación han sufrido desafíos, como la demanda de profesionales competentes, con conocimientos científicos, habilidades y trabajo en equipo, para implementar cuidados de calidad, seguros y humanizados. Surgen los primeros Especialistas de Enfermería en el Cuidado del Paciente Crítico para hacer frente a escenarios clínicos complejos que se presentan en las UTI. La experiencia clínica pone de manifiesto vínculos entre profesores, alumnos y personal de los servicios.

Objetivo: Comprender las expectativas que perciben los profesores y estudiantes durante la experiencia clínica en los diferentes centros de rotación.

Metodología: cualitativa fenomenológica. La población fueron alumnos y tutores. Muestra por saturación Técnica: grupos focales, en la que se aplicó una guía - entrevista, con dimensiones orientadoras: Individualización, Innovación, Implicación de Actividades, Personalización, Distribución de Actividades y Expectativas de los alumnos/tutores.

Hallazgos: Alumnos: Individualización: escasa autonomía en la toma de decisiones. Innovación: pedagogías diversas en cada escenario clínico. Implicación de los Alumnos: depende de los mismos, del tipo de servicio e institución y de los propios profesionales del equipo. Personalización: se perciben diferencias entre tutores, se permitió retroalimentación. Distribución de Actividades: la diversidad de actividades en cada escenario clínico fue favorable. Expectativas del Alumno: evolución positiva facilitada por la metodología de la problematización. Tutores: también obtuvimos resultados sobre: Individualización, Innovación, Implicación de los docentes, Personalización, Distribución de Actividades y Expectativas del Tutor.

Conclusión: mantener un entorno de aprendizaje clínico positivo para un proceso de enseñanza- aprendizaje.

2142

Autores: BHON J., OLIVERA M., RIVERO G., POUS L., GIUNTA A., VERDUGO R., TALIA J.

ASPECTOS CLÍNICOS, SEROLÓGICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS DE UN BROTE DE TRIQUINOSIS EN LA CIUDAD DE SAN LUIS

La triquinosis es una zoonosis ampliamente distribuida producida por el nematodo *Trichinella spiralis* entre otros. El principal ingreso del parásito causante de esta enfermedad en humanos es a través del consumo de carne de cerdo inadecuadamente cocida e infectada con larvas. Presentar y estudiar el caso de un brote de triquinosis ocurrido en la ciudad de San Luis, en el mes de junio del 2016, como un caso modelo de otros brotes ocurridos durante otro periodo. Se detectaron 10 casos de triquinosis aguda en la ciudad de San Luis, todos provenientes del mismo origen, y de esta forma identificando el brote y actuando de manera coordinada se logró bloquear la posible propagación. Las muestras fueron analizadas en LSP de la Provincia mediante la técnica de EIA. Este kit de enzimoimmunoensayo cualitativo permite detectar anticuerpos Anti-*Trichinella spiralis* en suero humano y es provisto por el Depto. de Parasitología dependiente de la red ANLIS. Pese al difícil diagnóstico del padecimiento, debido principalmente a su baja y esporádica frecuencia si como la inespecificidad de sus síntomas, se logró encontrar el origen del foco. El análisis serológico de las once muestras recogidas luego de la detección del caso índice y de una exhaustiva anamnesis de los posibles casos, determino la cantidad de diez positivos. Las condiciones laborales, sociales y culturales de la población de la zona constituyen un campo propicio para mantener, e inclusive incrementar, la incidencia de esta parasitosis, si no se adoptan medidas de prevención y control adecuadas. Está demostrado que el comercio clandestino del cerdo y sus subproductos constituye uno de los principales factores de riesgo para esta zoonosis, las campañas de educación permiten controlar este tipo de infección.

29

2144

Autores: BECARIA COQUET J., CABALLERO V., CAMISSASSO M., GONZALEZ M., TUMAS N., DIAZ M., MUÑOZ S., ABALLAY L..

CÁNCER DE MAMA, OBESIDAD Y DIETA PRO-INFLAMATORIA

Introducción: El cáncer de mama es una enfermedad multifactorial y ha sido asociada a varios factores ambientales. Específicamente, la obesidad y la dieta inflamatoria se han asociado con un incremento en el riesgo de presentar cáncer de mama en mujeres. De este modo, cambios endócrinos relacionados a estos factores pueden activar una respuesta inflamatoria, que favorece la ocurrencia de cáncer de mama.

Objetivo: Evaluar la asociación entre el consumo de una dieta inflamatoria y el riesgo de ocurrencia de cáncer de mama, considerando el estado nutricional, en la provincia de Córdoba (Argentina).

Material y método: Se llevó a cabo un estudio caso-control durante el periodo 2008-2016 (346 casos y 566 controles). Se construyó un score de dieta inflamatoria que incluyó 15 variables alimentarias (consumos de nutrientes y alimentos), obtenidas mediante un formulario de frecuencia de consumo alimentaria validado. Un score (0, 0,5 o 1) fue asignado a cada variable incluida dependiendo de la adherencia a recomendaciones alimentario-nutricionales. Se calculó el score de dieta inflamatorio para cada mujer estudiada. Se estimaron modelos de regresión logística múltiple para evaluar la asociación entre dieta inflamatoria y riesgo de cáncer de mama, estratificando por la presencia de obesidad.

Resultados: La media (DE) del score de la dieta inflamatoria fue de 6,7 (0,9) en todas las mujeres estudiadas. El 20% presentó obesidad y se observó que por cada incremento en una unidad en el score de dieta inflamatoria, aumentaba el riesgo de presentar CM un 42% si presentaban obesidad (Odds Ratio: 1,42; Intervalo de Confianza: 1,1-1,84).

Conclusión: Las mujeres con obesidad que adhieren a una dieta inflamatoria presentan un mayor riesgo de ocurrencia de cáncer de mama en Córdoba (Argentina).

2147

Autores: DE LEONARDI A., VIRGA C., AGUZZI A., LOPEZ V., DE LEONARDI G.

LA FARMACOVIGILANCIA EN ACCIÓN: REPORTES RECIBIDOS EN EL AÑO 2016

Fundamentación: Los medicamentos modernos han cambiado la forma de tratar y combatir las enfermedades. Sin embargo, pese a todas las ventajas que ofrecen, cada vez hay más pruebas de que las reacciones adversas a los fármacos son una causa frecuente, aunque a menudo prevenible, de enfermedad, discapacidad o incluso muerte, hasta el punto de que en algunos países figuran entre las 10 causas principales de mortalidad.

Objetivo: Describir las reacciones adversas a medicamentos (RA) en las notificaciones realizadas por los alumnos del tercer año de la carrera de Odontología UNC durante el año 2016.

Materiales y Métodos: Realizadas a través de imputaciones con el algoritmo de Naranjo mediante la ficha técnica proporcionada por Administración Nacional de Medicamentos, alimentos y tecnología médica (ANMAT).

Resultados: De un total de 185 fichas relevadas, Edad menos de 20 años 12%, de 20 a 40 años 62%, de 40 a 60 años 18% y un 8% más de 60 años. Sexo 82% de mujeres y 18% de hombres. En cuanto algoritmo de Naranjo un 58% de probable y 42% de posibles. Medicamentos 45 % AINEs, 18% Bloqueantes β , 22% de Antibióticos, 6% de Glucocorticoides, Vitaminas 4%. Las RAM más frecuentemente identificadas fueron Hipersensibilidad 32%, Trastornos gastrointestinales 28%, Respiratorios 12%, Renales 8%, en cavidad Oral 6%. Estudios estadísticos: descriptivo porcentual.

Conclusión: En todos los medicamentos, los beneficios vienen a compensar la posibilidad de efectos perniciosos. Es posible minimizar éstos velando por un uso racional de medicamentos seguros, eficaces y de calidad y procurando que a la hora de tomar decisiones terapéuticas se tengan en cuenta las expectativas y preocupaciones del paciente.

2148

Autores: RESCALA OSRE V., LUQUE L., GOMEZ R.

CYBERLOAFING EN POBLACIÓN ADULTA USUARIA DE TECNOLOGÍAS

El término “Cyberloafing” puede traducirse como vagabundeo en internet (Askew et al, 2011), y fue acuñado para describir el uso inapropiado de internet en horario laboral. Según Yang Yla (2014), el 90% de los encuestados admitieron haber explorado en internet sitios recreativos durante horas laborales, y el 84% reconoció el envío de mails personales desde el trabajo; se estimó que cerca de un tercio del tiempo laboral se gasta “perdiendo tiempo en Internet”. Este hábito aparentemente inofensivo parecería asociarse a adicciones tecnológicas, y supone consecuencias negativas para el trabajo y para la vida familiar y social.

Se buscó identificar Cyberloafing en usuarios de Tecnologías de información y comunicación (TIC), en una muestra accidental compuesta por 203 trabajadores de ambos sexos, de 25 a 65 años de edad, de Despeñaderos (Argentina). Se realizó un estudio descriptivo correlacional, aplicando escalas psicométricas de Cyberloafing, Dependencia Tecnológica y miedo a quedar afuera (FoMO).

El 25.6% tiene intención de realizar, en el próximo mes y durante horario laboral, compras en internet, uso de redes sociales en computadora y teléfono móvil, envíos de emails no asociados al trabajo, y navegación en sitios recreativos. El 52.7% presenta al menos tres conductas identificables como Cyberloafing. No hay diferencias por sexo; el Cyberloafing es mayor entre los menores de 55 años y entre los trabajadores de comercio; no se asocia con FoMO; es moderada la correlación con usos problemáticos de computadoras ($p < 0.05$), de internet ($p < 0.05$) y de teléfono móvil ($p < 0.05$).

El Cyberloafing está generalizándose y se suma a otros problemas de salud mental que ocasionan las TIC. Exige la ideación de nuevas estrategias preventivas y de intervención en salud.

CONOCIMIENTO Y UTILIZACION DE ANTICONCEPTIVOS DE ESTUDIANTES DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Introducción: Las prácticas anticonceptivas (PAC) son de gran interés dentro de la Salud Pública. Adolescentes y adultos jóvenes constituyen una población con dispar conocimiento de PAC y prevención de enfermedades de transmisión sexual.

Objetivo: identificar y analizar el nivel de conocimiento y utilización de métodos anticonceptivos en estudiantes de primero y quinto año de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba.

Material y Método: Estudio transversal basado en encuesta, confeccionada específicamente, con validación previa y contestada voluntariamente por 577 estudiantes de medicina de primero y quinto año, seleccionados con muestreo aleatorio simple en dos etapas: asignaturas Medicina Antropológica de 1° y Clínica Pediátrica de 5°. El análisis estadístico se realizó con la prueba "t". Las variables categóricas se trataron con χ^2 . Se estableció un nivel de significación de 95%.

Resultados: Las encuestas, 278 de 1° año y 299 de 5°, mostraron un predominio de mujeres (63%) en ambos cursos. El 34% del total de alumnos conocen todas las PAC, 26% varones y 38% mujeres ($p=0,006$), 16% de 1° año y 50% de 5° ($p = 0,0001$). Usan PAC 86% de 1° año y 93% de 5° ($p=0,001$). El método más usado por estudiantes de ambos ciclos fue el condón seguido de hormona oral. La combinación de ambos fue la asociación preferida en 1° y 5° año (53% respectivamente). Conclusiones. Del total de estudiantes 34% conocen todas las PAC siendo condón y hormona oral los mejor conocidos y ésta más conocida por mujeres. La PAC más usada es el preservativo masculino que unido a hormona oral constituye la asociación preferida. Los alumnos de 1° año eligen el preservativo masculino como método anticonceptivo único. El año de cursado no influye sobre el conocimiento de PAC al concluir la carrera.

SEROPREVALENCIA DE CHAGAS EN POBLACION INFANTIL DE 5 A 14 AÑOS EN LA PROVINCIA DE JUJUY, AÑOS 2011-2013

Introducción: Los desafíos de la Iniciativa del Cono Sur y Organización Panamericana de la Salud fueron el control vectorial, transfusional y finalmente el de la transmisión connatal. Nuestra provincia ha certificado en el 2001 y recertificó en el 2012 la interrupción de la transmisión vectorial, por lo tanto se encuentra en los umbrales de un nuevo reto, el control y seguimiento del Chagas Connatal. Es imprescindible implementar acciones de intervención y control de la infección connatal por *T. cruzi* debido a la importancia que la misma tiene sobre la salud de los niños y la epidemiología de la parasitosis.

Objetivo: Evaluar la seroprevalencia para Chagas en población infantil de 5 a 14 años en cada región de la Provincia de Jujuy.

Métodos: Se estudiaron un total de 8022 niños entre 5 y 14 años residente en las diferentes regiones de la Provincia de Jujuy. También se estudió al núcleo familiar de cada niño cuya serología resultó reactiva para Chagas. Se calcularon las prevalencias de Chagas en cada región y la comparación de las proporciones encontradas se realizó con la prueba de Chi cuadrado. El diagnóstico se realizó utilizando las técnicas de Elisa, Hemoaglutinación Indirecta y Test de Inmunofluorescencia.

Resultados: La prevalencia de Chagas en niños de 5-14 años es de 0-1.44%. En todos los casos estudiados se confirmó que la transmisión fue materno-fetal.

Conclusiones: Ya que en la mayoría de los hijos de madres portadora de Chagas la enfermedad cursa en forma asintomática, y dado que se ha demostrado que los casos encontrados son connatales, es importante fortalecer el control y seguimiento del binomio madre-hijo al momento de nacer, para que los mismos sean controlados en forma oportuna.

2155

Autores: BOGNANNO P., CÓRDOBA S., HUERGO J., RUIZ BRÜNNER M.

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESTADO NUTRICIONAL EN LAS INFANCIAS

Introducción: Los estados de (mal) nutrición de niños/as son contruidos socialmente, para ello no basta reparar en indicadores antropométricos, alimentarios, bioquímicos o clínicos, sino también en cómo están modelizados por las condiciones materiales de vida.

Objetivo: Analizar el proceso de construcción social del estado nutricional de los/as niños/as entre 4 y 10 años de edad de Casa Macuca.

Metodología: Investigación cualitativa. Los/as participantes fueron mujeres madres e hijos/as adheridos al programa CONIN por muestreo homogéneo. Se realizaron análisis de fuentes secundarias, observaciones participantes, entrevistas semi-estructuradas, encuentros con mujeres y niños/as. Análisis de datos: lectura, codificación, presentación, reducción e interpretación.

Resultados: Dimensión condiciones materiales de vida: Las familias desarrollan su cotidianidad en contextos de pobreza. Dimensión alimentaria: Las mujeres son protagonistas en los sistemas culinarios familiares. Los alimentos marcadores de la alimentación familiar son ricos en hidratos de carbono, predomina la comida de olla. Realizan tácticas culinarias para: hacer de comer a sus hijos/as lo que ellas quieren y por razones económicas. Los circuitos/circulaciones familiares se centran en el barrio, en cambio, las infantiles en el comedor escolar y Casa Macuca. Las preferencias alimentarias de los/as niños/as se basan en la relación lácteos/sabor-dulce/infancia. Las mujeres prefieren alimentos considerados sanos para sus hijos/as. Dimensión antropométrica: 18,75% de los/as niños/as presentó (mal) nutrición.

Conclusiones: Es importante (re)pensar la construcción del estado nutricional de las infancias desde una mirada holística. La separación del estado nutricional en dimensiones es solo analítica, no epistemológica.

2165

Autores: MATURANO E., PONS A., MILEWSKI M., ALMADA D., ILARDO R., DIB M.

AUTORREFERENCIACION Y GEOLOCALIZACION INSTANTANEA DE SINDROMES FEBRILES MEDIANTE UNA APLICACIÓN PARA DISPOSITIVOS MÓVILES

Introducción: Nuestra región se ve afectada por virosis transmitidas por *Aedes spp* y cuadros respiratorios invernales particularmente en niños. Cada año se suman víctimas sobrepasando los esfuerzos tendientes al control sanitario siendo el tiempo que media entre el comienzo de los síntomas y la recepción de información una variable crítica.

Objetivo: 1 Desarrollar una App capaz de autorreferenciar y geolocalizar cuadros febriles en forma instantánea. 2 Monitorear el funcionamiento y alcance de la App en la población de Jesús María, Provincia de Córdoba.

Materiales y Método: Tras identificar necesidades de diseño se implementó una App y un servidor habilitado para smartphones con sistema Android que permite al usuario informar su localización y solicitar atención médica. La aplicación y el lenguaje del servidor utilizan entornos Phonegap y PHP, y la página WEB formatos HTML/JS/CSS. El alojamiento funciona con un servicio pago garantizando accesibilidad en un 99,9% de las prestaciones. La aplicación envía información a un servidor y por rutinas comunica cada 8 horas los datos autorreferenciados por los propios enfermos. La información recibida permite generar un triage epidemiológico exportable a bases Excel y geo referenciarla mediante programas GIS. Finalmente la contra referencia es decidida por las autoridades de salud.

Resultados: Entre el 01/12/2016 y 31/03/2017 se generaron 960 informes desde el servidor al nodo sanitario. La ausencia de casos vinculados a *Aedes spp* redujo la información a pocos falsos positivos.

Conclusión: Pese a la ausencia de casos y el consecuente bajo empleo de la App el sistema funcionó con una eficiencia del 100% convirtiendo al mismo en un recurso ideal para la vigilancia en salud.

2167

Autores: UGNIA L., TROLLET J., TARABLA H.
 Facultad de Agronomía y Veterinaria. Universidad Nacional de Río Cuarto.
 Córdoba. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad Nacional del Litoral.
 Santa Fe.

ACCIDENTES LABORALES EN VETERINARIOS DEDICADOS A LA PRODUCCIÓN PORCINA.

Introducción: La práctica de la medicina veterinaria expone al profesional a peligros que pueden causar enfermedades o lesiones. El contacto estrecho con animales, productos biológicos, instrumental y vehículos utilizados en tránsito in itinere, son algunos factores frecuentemente involucrados en los accidentes laborales. **Objetivo:** evaluar los accidentes laborales (AL) en veterinarios dedicados a porcinos y sus factores asociados.

Métodos: Se realizó un estudio observacional, transversal, con muestreo aleatorio simple, n=100 (error 6%, nivel de confianza 95%, frecuencia previa 90%), datos recabados con cuestionario estructurado. Análisis estadístico: t de Student, χ^2 y test exacto de Fisher.

Resultados: Los encuestados tenían 38,0±9,1 años de edad y se habían graduado hacía 11,8±9,6 años. El 80% eran del sexo masculino. El 84% sufrió AL, 39,3% de los accidentados in labore requirió atención médica y 44,7% tuvo ausencias laborales (18,4±14,2 días). Quienes tuvieron AL tenían más años de antigüedad profesional (P=0,007). No hubo asociación con sexo ni horas dedicadas a la actividad. Las lesiones más frecuentes fueron herida (punzante 69%, cortante 59%, por mordedura 32%), contusión 50%, contractura 22% y esguince 11%, involucrando animales (69%), elementos punzocortantes (aguja sutura 26%, hipodérmica 56%, bisturí 42%, cuchillo castración 26%, necropsia 22%) e instalaciones (47%). El 25% tuvo accidentes de tránsito in itinere, siendo más frecuentes entre los hombres (P=0,021). No hubo asociaciones con antigüedad profesional ni horas de actividad. El 72% requirió atención médica y 20% internación hospitalaria.

Conclusión: Estos resultados confirman lo investigado en veterinarios dedicados a otras especies. Esta profesión es de alto riesgo laboral y requiere extremos cuidados para no sufrir consecuencias indeseables.

2171

Autores: DEMARCHI M., FIGUEROA M., LESCANO Y., BECARIA COQUET J., DIAZ M.

ALIMENTACIÓN, HÁBITO DE FUMAR Y SEDENTARISMO: APORTES AL CONOCIMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN CÓRDOBA

Introducción: Varios factores ambientales se han asociado a la ocurrencia del cáncer colorrectal (CCR). La alimentación, el hábito de fumar y el sedentarismo son algunos de ellos. En Córdoba (Argentina), trabajos recientes identificaron dos patrones alimentarios característicos de la población, los cuales se asociaron al riesgo de presentar CCR. Uno de éstos, Patrón Cono Sur (PCS), es caracterizado por un mayor consumo de carnes rojas, vegetales amiláceos y vino; y el otro, Patrón Prudente (PP), con elevados consumos de frutas, vegetales no amiláceos y lácteos.

Objetivo: Caracterizar los estilos de vida en sujetos mayores de 18 años que participan en el estudio caso-control de CCR y adhieren al PCS y PP, e identificar su asociación con la patología, en la provincia de Córdoba.

Metodología: A partir de un estudio caso-control (2008-2016), con 147 casos y 304 controles, se recolectó información sobre alimentación y estilo de vida usando una encuesta cuali-cuantitativa validada. Se estimaron modelos de regresión logística múltiple.

Resultados: Los sujetos con un consumo elevado de vitamina C tuvieron 46% menos chances de presentar CCR respecto de aquellos con bajo consumo (p<0,05). El consumo de fibra dietética, calcio, selenio y hierro no estuvo asociada a la ocurrencia del CCR; en cambio, fue significativa la asociación entre consumo de pollo cocido por calor seco y el CCR (OR: 1,74; p=0,05). No se encontró asociación entre hábito de fumar, sedentarismo y el CCR, sin embargo, existió asociación entre hábito de fumar y adherencia al PCS y al PP (p<0,01).

Conclusión: El hábito de fumar se asoció significativamente al PCS y al PP. El consumo de vitamina C ejerció un papel protector, mientras que el consumo de pollo cocido por calor seco aumentó el riesgo de presentar CCR.

2172

Autor: GARAY G.

INFLUENCIA DEL ÁREA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA EN LOS NIVELES DE ANSIEDAD FRENTE A LA MUERTE

Introducción: Los enfermeros, por su labor cotidiana, tienen contacto con la muerte. La formación académica podría ofrecerles herramientas para disminuir las actitudes y emociones frente a este fenómeno. Existen diferentes concepciones de la muerte desde el trabajo de Enfermería en el área de Terapia Intensiva (UTI) y Clínica Médica (CM), donde los cuidados hacia el enfermo se orientan por un lado a la urgencia y por otro a los cuidados paliativos.

Objetivo: Examinar el efecto del área de desempeño sobre los niveles de ansiedad frente a la muerte (AFM) en el personal de Enfermería, así como la incidencia de variables demográficas.

Materiales y Métodos: El estudio se realizó en un hospital privado de CABA. Se suministró una Encuesta Sociodemográfica a 120 enfermeros de las áreas CM y UTI y se les suministró el Test “La Escala de Miedo a la Muerte de Collett-Lester” en su adaptación española.

Resultados: Tanto enfermeros de CM como de UTI presentaron AFM pero incrementada por distintas sub-escalas; los primeros aumentaron en la variable “en relación con la propia muerte” y los segundos “sobre el proceso de morir de otros”. La Encuesta Sociodemográfica arrojó relaciones interesantes entre AFM y el estado civil, la edad y la formación académica.

Conclusión: Los enfermeros de CM, tienen una función enmarcada en “cuidados paliativos” que contribuirían a vincularse íntimamente con el paciente, incrementando los niveles de ansiedad frente a su propia muerte. En contraposición, el personal de UTI se enfrenta a situaciones urgentes donde confronta con la dicotomía éxito-fracaso de recuperación llevando a una despersonalización; el interés está centrado en las acciones que impidan la muerte del paciente incrementando los niveles ansiógenos respecto al proceso de morir de otros.

2181

Autores: LIBOÁ R., GOMEZ C., SEGRE E., CORIA N., DIEZ O., RACICHI I., SANCHEZ A., FERNANDEZ M., DAVICINO R., POSSE J., SOBRE CASAS B.

AUDITORÍAS ALIMENTARIAS COMO RECURSO PARA FORTALECER LA INOCUIDAD ALIMENTARIA DESDE BROMATOLOGÍA MUNICIPAL.

Introducción: La auditoría alimentaria es un procedimiento organizado de recolección de información, sistemático, con revisión de registros y un criterio para evaluar actividades. En los pequeños establecimientos no es posible disponer de asesores técnicos, por lo que una auditoría oficial puede conformar una oportunidad de capacitación in situ y de mejora muy útil. En los municipios del O.I.B.C.A. (Organismo Intermunicipal de Bromatología y Control Ambiental), se intenta poner en práctica un modelo semejante. **Objetivo:** Desarrollar una metodología con base tecnológica, para gestionar un programa integral de auditorías alimentarias.

Metodología: El procedimiento se desarrolló en acuerdo a la NORMA ISO 19.011, con modificaciones. Para la calificación se utilizó el Manual de HACCP de INPPAZ-OPS y la Disposición 1930/95 de ANMAT. Se desarrolló una aplicación con el Programa Visual Basic Versión 6.0 Upgrade 6 y base de datos anexa en Microsoft Acces.

Resultados: Se logró un sistema dinámico que puede funcionar on line, con una lista de chequeo para comedores de 12 bloques con 152 preguntas, cuyo criterio de auditoría fueron BPM-POES-MIP y que se generan automáticamente según el establecimiento (Comercial e Institucional). Cada bloque tiene una importancia (cuantitativa) y cada pregunta una categoría: Necesaria, Recomendable o Crítica (cualitativa). De la combinación surgen los valores de cada pregunta y la calificación final. El administrador puede aumentar o disminuir la exigencia. Al final se informa el resultado y se trabaja con el auditado las acciones correctivas.

Conclusión: Es importante contar con una metodología definida, sustentada en una herramienta ágil, dinámica e integral, que permitan no solo evaluar cada situación sino conformar una instancia de capacitación in situ.

2186

Autores: SCATENA M., CASTILLO G., AZCURRA A., BAREMBAUM S., BELARDINELLI P., LIANDRO M., ZAPATA M., CACIVA R., MORELATTO R., GREÑÓN M., LOPEZ DE BLANC S.

PREVALENCIA DE CANDIDA EN POBLACION ADULTA DE CORDOBA Y HABITOS DE CONSUMO

Introducción: La salud bucal incide sobre la calidad de vida de la población y puede ser influenciada tanto por factores sistémicos como por la dieta y/o el consumo de tabaco, alcohol y mate. Cawson en 1966 sugirió el rol de Candida como promotor de proliferación epitelial irreversible; por lo que su presencia en el biofilm bucal no sólo se asocia a candidiasis sino también a lesiones potencialmente malignas y al cáncer bucal. **Objetivo:** Determinar la prevalencia de especies Candida y su asociación con hábitos de consumo.

Material y método: se realizó un estudio epidemiológico, observacional y descriptivo en adultos voluntarios (n=401) de la ciudad de Córdoba. Se completó la historia clínica, donde se registró el consumo de tabaco, alcohol y mate. Se realizó examen clínico bucal y se recolectó material para el examen micológico. En el análisis estadístico se aplicó la prueba de Chi cuadrado y de Wilcoxon.

Resultados: El 99% de los exámenes directos presentaron levaduras y el 58% hifas. El 42% de los cultivos fueron (+); C. albicans (CA) se identificó en el 77% y C. no albicans (CNA) en el 9% (5% C. tropicalis y 4% C. glabrata), mientras que el 14% correspondió a cultivos mixtos. El 3,5% de los voluntarios presentaron lesiones de candidiasis, siendo C. albicans más prevalente ($p=0,0002$). En aquellos individuos con niveles más altos de consumo de tabaco y/o alcohol se aislaron más frecuentemente especies CNA ($p<0,001$).

Conclusión: los hallazgos del presente estudio, sin precedentes en la población de Córdoba, revelan una alta prevalencia de directos (+) y el predominio de CNA en individuos considerados de alto riesgo para el cáncer bucal. El rol de las diferentes especies Candida en el biofilm oral, indica la necesidad de profundizar estudios sobre su fisiopatogenia.

2191

Autores: PALACIO CARRANZA I., BERNERO M., JARDÓN M., BASTIDA M., MIAS C.

PREVALENCIA DE DETERIORO COGNITIVO Y DEPRESIÓN EN UN SERVICIO PÚBLICO DE NEUROPSICOLOGÍA

Introducción: El diagnóstico diferencial entre envejecimiento normal, deterioro leve, demencias y depresión resulta importante para el desarrollo de intervenciones preventivas y asistenciales.

Objetivos: 1. Explorar prevalencia de personas con deterioro cognitivo leve (DCL), deterioro cognitivo moderado (DCM) y depresión que acuden al Servicio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la UNC. 2. Explorar la relación entre las variables estado cognitivo, motivo de consulta y depresión.

Metodología: Estudio Transversal, descriptivo, exploratorio. **Población:** Participantes concurrentes al Servicio de Neuropsicología en los años 2014-15 (n=537), con edad promedio de 67,42 y de instrucción 13,57 años; que cumplen con protocolo de evaluación. **Instrumentos:** Entrevista, pruebas neuropsicológicas multifunción, cuestionarios conductuales, afectivos y de familiar informante. **Estadísticos:** Descriptivo y Chi cuadrado.

Resultados: Se encontró un 41,5% de sujetos normales; un 38,2% de DCL, y un 20,3% de DCM. El 46,7% de los casos presentó indicadores de depresión posible. Existe una asociación entre las variables estado cognitivo y depresión ($\text{Chi}^2=22,61$; $p=0,000$); y una asociación moderada de la variable motivo de consulta y estado cognitivo ($\text{Chi}^2=76,0$; $p=0,000$).

Conclusiones: El 41,5% de los evaluados presentó estado cognitivo normal. Por otra parte, una de cada dos personas, arriban con indicadores de depresión, que se asocia en mayor grado al deterioro cognitivo. La prevalencia de normalidad disminuye con los años, y en la medida que el motivo de consulta es por indicación profesional o familiar. Esto sugiere que la sospecha de deterioro proveniente de un profesional o familiar incrementa su probabilidad de modo significativo.

2205

Autores: HALUSZKA E., DÁVILA V., DIAZ M., NICLIS C.

ASOCIACIÓN ENTRE EL ÍNDICE Y CARGA GLUCÉMICA, Y EL CÁNCER COLORRECTAL EN CÓRDOBA

Introducción: El cáncer colorrectal (CCR) constituye la segunda causa de muerte por cáncer. En su etiología pueden verse involucrados un elevado índice (IG) y carga glucémica (CG) de la alimentación, dado que la hiperglucemia genera un aumento compensatorio de la insulinemia y el IGF-1, favoreciendo la proliferación de células cancerígenas.

Objetivo: Evaluar la asociación entre los indicadores de calidad y cantidad de hidratos de carbono consumidos y el riesgo de desarrollar CCR en la población de la provincia de Córdoba, durante 2008-2016.

Metodología: Se realizó un estudio caso control, con 492 personas (161 casos y 331 controles apareados por edad y lugar de residencia), entrevistadas con un cuestionario de frecuencia alimentaria validado. Para valorar el riesgo de CCR se ajustaron modelos de regresión logística múltiple incluyendo el IG y CG junto con la cantidad o frecuencia de consumo de alimentos de alto IG. El sexo, edad, IMC, ingesta energética, antecedentes de CCR, consumo de analgésicos, nivel socioeconómico y hábito de fumar fueron consideradas covariables de ajuste.

Resultados: Se observó asociación entre el IG (OR 1,03; IC95% 1,00-1,06), la CG (tercil 3 vs. tercil 1, OR 1,64; IC95% 1,16-2,34), y la frecuencia de consumo de alimentos de alto IG con el riesgo de CCR (tercil 3 vs. tercil 1, OR 1,11; IC95% 1,09-1,14). En mujeres el efecto promotor de estos indicadores fue mayor, principalmente para una alimentación con alta CG (OR 2,64; IC95% 1,7-4,08).

Conclusión: Una alimentación caracterizada por elevados IG, CG y frecuencia de consumo de alimentos con alto IG se asocia al riesgo de CCR, particularmente en mujeres. Se enfatiza la necesidad de profundizar el estudio de la frecuencia de consumo alimentario y su relevancia en el desarrollo de enfermedades.

2206

Autores: CACIVA R., BELARDINELLI P., MORELATTO R., BOLESINA N., SCATENA M., MELONI N., SAUCHELI V., BAREMBAUM S., CRISCUOLO I., LOPEZ DE BLANC S.

PRESENCIA DE LESIONES ESTOMATOLÓGICAS EN LA POBLACION DE CÓRDOBA CAPITAL. Y SU ASOCIACION CON FACTORES DE RIESGO

Introducción: La salud bucal impacta sobre la calidad de vida de la población y se ve influenciada por factores y hábitos regionales que pueden favorecer el desarrollo de lesiones.

Objetivo: estudiar la prevalencia de lesiones estomatológicas en la población de Córdoba y analizar su asociación con factores de riesgo.

Métodos: 401 voluntarios participaron en un estudio epidemiológico en la ciudad de Córdoba (CIEIS del Adulto). Se registraron lesiones estomatológicas, factores de riesgo: consumo de tabaco, mate y alcohol, HPV, Candida, nivel de instrucción. Los datos se analizaron mediante test de chi cuadrado.

Resultados: 67% de los voluntarios (n: 270) presentó lesión estomatológica: lesiones traumáticas crónicas leves 57%, el 15% fueron lesiones cancerizables (LC) y el 11% queilitis crónicas, el 3,5% presentó lesiones de candidiasis. El HPV estuvo presente en el 3,2% de la población, el 42% de los entrevistados fumaba, el 45% manifestó consumir bebidas alcohólicas ya sea de manera habitual u ocasional y el 76% tomaba mate. Al analizar la asociación entre las lesiones estomatológicas y factores de riesgo, se observaron mayores niveles de consumo de tabaco con LC ($p < 0,0001$) siendo más frecuentes los cultivos positivos de Candida ($p < 0,05$). Se observó una mayor frecuencia de HPV y de lesiones cancerizables (LC) en los voluntarios con menor nivel de instrucción.

Conclusión: Los resultados de este estudio muestran una alta prevalencia de lesiones cancerizables asociadas a niveles altos de consumo de tabaco, a la presencia de Candida, y a un menor nivel de instrucción. Se evidencia la importancia de conocer la presencia de factores de riesgo en la población, para la toma de medidas de prevención contextualizadas.

2207

Autores: VILLACE M., LÓPEZ L., AMIEVA M., BELFIORE S., ESTARIO M., ACOSTA L.

INFORMACIÓN, PERCEPCIÓN DE RIESGO Y COMPORTAMIENTOS EN RELACIÓN A LAS ZONOSIS

Introducción: Muchas de las actuales enfermedades emergentes y re-emergentes en seres humanos son transmitidas por animales.

Objetivo: Analizar la información, percepción y comportamientos en relación a las zoonosis en adultos de 18 años y más, en la ciudad de Córdoba.

Métodos: Estudio mixto cuanti-cualitativo. Etapa cuantitativa: se diseñó un estudio transversal y correlacional, mediante realización de encuesta para recabar datos sociodemográficos, factores de riesgo, información y comportamientos en relación a las zoonosis; con muestreo aleatorio, polietápico y estratificado. El análisis de datos fue descriptivo y mediante análisis bivariado. Etapa cualitativa: se utilizó la teoría fundamentada, para indagar argumentos que explican la percepción y/o comportamientos de riesgo. Los datos fueron recabados mediante entrevista en profundidad y observación participante, para el análisis de datos se utilizó el Método Comparativo Constante.

Resultados: Se observó que el 91% percibe riesgo para la salud la presencia de aguas estancadas y el 62% considera que es alto, presentando asociación con nivel económico alto; el 93% percibe riesgo la presencia de basura acumulada y el 69% la considera de alto riesgo; el 59% declaró tener mascotas. Los encuestados dijeron tener conocimiento sobre las enfermedades zoonóticas, pero no sabían cómo ocurría el contagio. De los resultados cualitativos se puede observar que el nivel de información es importante ante comportamientos preventivos para las zoonosis, existen otros factores ligados a los valores, nociones y creencias que influyen en los mismos.

Conclusión: El conocimiento sobre las enfermedades zoonóticas resulta fundamental, constituyendo la base de las medidas de intervención. Los resultados constituyen insumo para la formulación de acciones de promoción de la salud y prevención.

2214

Autores: DABBENE V., MALDONADO F., DUCLOUX DEIANA M., QUINZIO E., HERRERO M., RIZZI A., PAZ ZORRILLA P., BARRIENTOS V., PIQUERAS V., PALACIO L., SANCHEZ M., GUERRERO C.

MEDICAMENTOS LIBRES DE GLUTEN: UNA MIRADA A LA SITUACIÓN ACTUAL

Introducción: El gluten es una proteína presente en cereales como el trigo, la cebada, la avena y el centeno (TACC) y en sus derivados. Existe una fracción de esta proteína que, en algunos individuos predispuestos genéticamente, causa una lesión en la mucosa del intestino delgado que se conoce como Enfermedad Celíaca. El único tratamiento es seguir una estricta dieta sin gluten, durante toda la vida. Los medicamentos de uso oral pueden incluir excipientes que contengan trazas de gluten, presentando una problemática similar a la de los alimentos con estas proteínas.

Los objetivos de este trabajo fueron: describir la normativa relacionada a la certificación y rotulado de Medicamentos Libres de Gluten (MLG) y conocer qué especialidades farmacéuticas del mercado son MLG, a través de análisis realizados en Ceproc y los ya publicados en la página de ANMAT.

Métodos: Se realizó una búsqueda sistemática exploratoria-descriptiva de la información disponible en la web sobre la legislación en MLG en Argentina y Latinoamérica. Se analizaron comprimidos elaborados en nuestra provincia, empleando el Kit de ELISA R5 Méndez.

Resultados y conclusiones: La Disposición ANMAT N° 2574/13, define MLG y establece la obligatoriedad del análisis que demuestre esta condición para los medicamentos de administración oral. En Córdoba la Ley provincial N° 9142 promueve el análisis y el rotulado de "Medicamento apto para celíaco". Argentina ha sido pionera en legislar sobre MLG y es referente para el resto de los países. Hay MLG disponibles en el mercado que han demostrado su condición mediante la técnica analítica oficial para alimentos. Es fundamental para los pacientes celíacos que los profesionales de la salud estemos informados sobre este tema para lograr un sistema de salud más integrado, equitativo, inclusivo y eficiente.

2231

Autores: ULLOA V., ALVARADO R., AGUILERA H.

INTERVENCIÓN EN TIEMPO CRÍTICO, SU EFECTO EN LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS, EN PACIENTES CARDIOVASCULARES

Introducción: La falta de adherencia terapéutica farmacológica y no farmacológica en las enfermedades crónicas constituyen, uno de los problemas más trascendentes para el sistema de salud en nuestro país y el mundo. Se hace necesario probar y evaluar el impacto en la adherencia farmacológica y no farmacológica de una intervención innovadora como, la intervención en tiempo crítico (CTI) por medio de trabajadores comunitarios en salud (TCS). Esta intervención es parte del proyecto MECESUP de la Universidad de Chile.

Objetivo: Comparar el efecto al adicionar una intervención específica (CTI) al tratamiento habitual aplicado por trabajadores comunitarios (TCS) en la adherencia a indicaciones farmacológicas y no farmacológicas en pacientes portadores de Diabetes Mellitus 2 y/o Hipertensión Arterial.

Material y método: El diseño del estudio corresponde a un ensayo clínico controlado randomizado, de intervención comunitaria. Se alcanzó una muestra de 64 pacientes. Se administraron diversos instrumentos para la evaluación de la adherencia estos fueron administrados pre y post intervención en ambos grupos.

Resultados: Se estableció un valor p de 0,01, para determinar significancia en la variación de los porcentajes tanto para el cambio, como para atribuir este a la intervención. Existe una variación significativa en: adherencia a fármacos, no consumo de azúcar, no agrega sal, actividad física modera-alta, no consumo de alcohol. De estos cambios el atribuible a la intervención fue, la adherencia a fármacos (Test Morisky Green Levine) con OR de 12,7 ($p=0,0083$), lo que permite establecer con una seguridad del 99,2%, que la variación del cambio en la adherencia a fármacos, se debe a la intervención.

Conclusión: La CTI aplicada por TCS, muestra una mejora significativa en la adherencia a fármacos

2233

Autores: HUPPI P., GERMAIN M., ENDERS J.

EFFECTOS DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA SOBRE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR CRONICA

Introducción: Las enfermedades pulmonar crónica (EPC) representan una causa importante de carga de enfermedad en el mundo. Los programas intensivos de rehabilitación cardio-respiratoria podrían mejorar la calidad de vida de estos pacientes.

Objetivo: evaluar los efectos de un programa de rehabilitación cardio-respiratoria sobre calidad de vida en pacientes con enfermedad pulmonar crónica.

Método: estudio analítico y de corte longitudinal. Población: pacientes con diagnóstico de ECNT, según criterio CIE-10 ($n=119$) del servicio de pruebas respiratorias-cardio pulmonares del Hospital de la Croix Rousse, Lyon, Francia. Para evaluar los efectos del programa de rehabilitación cardio-respiratoria (PRC-R), se evaluó calidad de vida a través del test de George antes y después. Las variables fueron estudiadas según la naturaleza de las mismas. Se utilizó prueba t para muestras apareadas y test pareado de Wilcoxon.

Resultados y discusión: La media de edad fue de 63,01 años ($\pm 13,40$) [rango 19 a 89 años]. El 38,89% fueron de sexo femenino. El 64,71% tuvo diagnóstico de alguna patología del grupo de enfermedades del sistema respiratorio (Capítulo X), de los cuales el 54,55% correspondió a enfermedades respiratorias crónicas. El 21,01% tuvieron diagnóstico de neoplasias (capítulo II), de los cuales el 68% correspondió al grupo C30-C39, neoplasias de órganos respiratorios e intra-torácicos. Los pacientes que recibieron PRC-R mejoraron los parámetros disnea ($p<0,001$), fatiga ($p<0,001$), potencia cardiovascular ($p=0,002$) y el impacto del test de George ($p=0,04$). Estos resultados son preliminares, sin embargo aparenta resultados positivos para los pacientes con ECNT que reciban este programa. Esto podría mejorar la calidad de vida de los pacientes y disminuir la carga de enfermedad.

EFFECTOS DE UN PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIO-RESPIRATORIA SOBRE EL CONSUMO DE OXIGENO Y CALIDAD DE VIDA EN MUJERES QUE RECIBIERON TRATAMIENTO QUIMIOTERAPICO POR NEOPLASIA

Introducción: Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) causan o están relacionadas con aproximadamente el 80% de la mortalidad en el mundo. El cáncer, es la segunda causa de mortalidad por ECNT. La detección de cáncer en una fase avanzada, la falta de diagnóstico y tratamiento son problemas frecuentes con implicancias en salud pública.

Objetivo: evaluar los efectos de un programa de rehabilitación cardio-respiratoria (PRC-R) sobre el consumo de oxígeno y la performance física en mujeres con diagnóstico de neoplasias.

Método: estudio analítico y longitudinal, para evaluar cambios tras la aplicación del programa PRC-R en mujeres que recibieron tratamiento quimioterápico por neoplasia (n=135). El estudio se está realizando en el Hospital de la Croix Rousse, Lyon, Francia. Las variables fueron estudiadas según la naturaleza de las mismas. Se utilizó prueba t para muestras apareadas y test pareado de Wilcoxon, a fin de evaluar cambios antes y después del PRC-R.

Resultados y discusión: La media de edad fue de 51,97 ($\pm 10,24$) [rango 27 a 81 años]. Entre los diagnósticos más frecuentes se identificaron, 88,89% neoplasias malignas de mama (C50) y 11,11% neoplasias malignas de órganos genitales (C51-C58). Tras recibir PRC-R, se observaron cambios significativos ($p < 0,001$) en la mejora de los parámetros cardiovasculares (VO₂, potencia y frecuencia cardíaca máxima), como así también en la escala de función física ($p < 0,001$), vitalidad ($p < 0,001$) y salud mental ($p < 0,002$) del instrumento SF-36 aplicado antes y después de la intervención. Se evidencia, preliminarmente, que recibir PRC-R mejora el consumo de oxígeno y la calidad de vida de las mujeres. Si los resultados finales del estudio, siguen siendo positivos, es importante transferirlos a los servicios de salud pública.

DESARROLLO DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS) PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUICIDIO Y FORTALECER FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD MENTAL, EN ADOLESCENTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE DOS REGIONES DE CHILE

El suicidio adolescente es un tema de creciente preocupación para el campo de la salud pública. Chile presenta la mayor tasa de suicidio en esta población entre los países del OECD, por lo cual el Ministerio de Salud ha priorizado su disminución entre sus metas sanitarias para la década. No obstante, esto no se ha mostrado mayores resultados hasta la fecha. Para abordar este problema en forma efectiva, en una manera adaptada a la cultura local, es esencial integrar la experiencia y los intereses de los propios adolescentes en la creación e implementación de estrategias. A luz de esto, y considerando la centralidad de la tecnología para jóvenes hoy en día, se está desarrollando una plataforma web para reducir el riesgo de suicidio y fortalecer factores protectores de la salud mental para adolescentes, la cual se evaluará a través de un ensayo clínico aleatoria en colegios municipales y subvencionados en dos regiones de Chile, en el marco de un estudio FONDEF financiado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. Además, se ha conformado un "grupo de expertos" para liderar y asesorar este proceso, compuesto por diversos adolescentes, entre 13 y 20 años de edad, quienes fueron seleccionados en base de su perspectivas del tema, creatividad y motivación. Ellos están activamente desarrollando el contenido, el diseño y la funcionalidad de la plataforma web, junto con miembros del equipo de investigación, y debatirán y validarán la propuesta con expertos técnicos –profesionales de la salud mental, salubristas e ingenieros computacionales. Luego, serán actores claves en el proceso de pilotar e implementar el programa en los colegios.

2258

Autores: LÓPEZ A., PEREA H., MACHADO A., SCHLIAMSER L., RAMOS VILA A., FACCHIN H., RAPISARDI G., CECCHETTO E.

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR Y HÁBITOS DE VIDA EN EMPLEADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Introducción: Reconocer los factores de riesgo de las enfermedades crónicas no transmisibles como el tabaquismo, la inactividad física y alimentación poco saludable permite acciones de promoción sobre hábitos saludables y prevención y control de enfermedades, para establecer políticas de Salud.

Objetivo: identificar factores de riesgo cardiovascular y hábitos de vida en empleados del Poder Judicial de Córdoba.

Métodos: Estudio descriptivo transversal, muestreo por conveniencia, en el marco de un programa de promoción de salud y vacunación. Variables categóricas proporciones, continuas media y DE, a partir de una entrevista.

Resultados: 593 entrevistas, el 66,1% mujeres, edad media 41,4, DE \pm 10,62 años. Hipertensión arterial 9,6%, dislipemia 12,6%, diabetes mellitus 4,9%. El 24,6% fuma actualmente, el 77% diariamente, un promedio de 9,3 cigarrillos cada día, el 69% piensa dejar de fumar. La media de tensión arterial sistólica (TAS) fue $117,06 \pm 14,8$ mmHg, tensión arterial diastólica (TAD) $74,40 \pm 11$ mmHg. La evaluación nutricional según índice de masa corporal fue: normopeso 54,8%, sobrepeso 28,8%, obesidad 12,6%, con un 41,8 % de exceso de peso (EP). El 74,5% ha consumido bebidas con alcohol en el último mes. Nivel de actividad física sedentario 16,9%, caminata 53%, 34,4% actividad física moderada, 38,8% actividad física intensa (insuficiente 35,2%, suficiente 47,7% para beneficio a nivel cardiovascular). El consumo promedio diario de frutas y verduras fue 1,35 y 1,32 respectivamente. El riesgo cardiovascular global según la OMS fue $<10\%$ en el 92,4%. La autopercepción del estado de salud actual fue excelente 6,8%, muy bueno 38,2%, bueno 43,3%, regular 1,8%, malo 0,8%.

Conclusión: En poblaciones jóvenes deben estimularse acciones para optimizar los hábitos saludables, riesgo modificables, a partir de programas e intervenciones de promoción de la salud y prevención de eventos cardiovasculares.

2261

Autores: CASTILLO M., IRAZUZTA M., REZZÓNICO M., PRIOTTO E., GIMENEZ EVJANIAN M., FLORES N., ALLENDE POSSE M., BREGAINS L., CASTILLO G., CASTILLO B.

FORMANDO PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE: INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA BIOSEGURIDAD EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Introducción: El ejercicio de las profesiones implica riesgos propios de la especialidad y del ambiente donde se desarrolla; una es la Odontología por la exposición a sangre, saliva aerosoles, ... durante la atención al paciente y por la manipulación de sustancias potencialmente nocivas para el hombre y el ambiente. Para institucionalizar prácticas seguras, desde el 2004, se investiga acerca del lugar que ocupa la formación en normas de bioseguridad (B) y los cambios de actitud respecto a su cumplimiento a fin que se conviertan en rutinas.

Objetivos: Institucionalizar prácticas bioseguras. Prevenir riesgos y evitar infecciones cruzadas. Educar para el desarrollo sostenible.

Metodología: Investigación desarrollada con modalidad de investigación-acción. Población seleccionada: Responsables de áreas de gestión; estudiantes cohorte 2015 y docentes de 1° a 4° año de la Carrera.

Resultados: 2014: Docentes de 1° Año seleccionaron contenidos; realizaron protocolo para prácticas. 2015: Investigadores observaron clases teóricas y prácticas para seguimiento de enseñanza. Se analizaron observaciones y surgió que docentes y estudiantes aplican ciertas normas pero no hay apropiación de otras. Docentes del 2° año fueron convocados; la respuesta no fue satisfactoria; sin embargo se acordó que el protocolo para estudiantes de 1° Año es también válido para los de 2°. 2016. Se abordó un trabajo similar con profesores de 3° año, mayoritariamente profesores asistentes; se generó protocolo general y otros diferenciados para actividades preclínicas.

Conclusión: Se avanzó en enseñanza de la B y en protocolización; la Gestión creó el Centro de B. y el Banco de Dientes, ambos favorecen la institucionalización; se percibe mejor uso de barreras de protección pero sigue habiendo resistencia en algunos docentes para ser "modelos".

3010

Autores: KIGUEN A.X., MOSMANN J.P., VENEZUELA R.F., CUFFINI C.G. LABORATORIO DE CHLAMYDIAS Y HPV. INSTITUTO DE VIROLOGÍA "DR. JM VANELLA".

Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba.

DETECCIÓN DE CHLAMYDIA TRACHOMATIS EN POBLACIÓN INFANTIL CON SOSPECHA DE ABUSO SEXUAL

Introducción: Chlamydia trachomatis (C.tr) causa la infección de transmisión sexual (ITS) más prevalente del mundo. En niños con sospecha de abuso sexual (SAS), la infección por C.tr es menor al 5%, pero su detección es diagnóstico de certeza y puede utilizarse como prueba legal del abuso. En Argentina no existen datos acerca de la infección por C.tr en niños con SAS, por lo que es importante estudiar su presencia y características genéticas. **Objetivo:** Caracterizar genéticamente cepas de C.tr detectadas en muestras no invasivas de niños con SAS.

Método: se estudiaron 30 niños de 3 a 13 años, con SAS a los cuales se les tomó muestras de hisopado faríngeo (HF) y orina para la detección de C.tr por biología molecular, utilizando cebadores dirigidos contra MOMP y plásmido de la bacteria. Las muestras positivas fueron sometidas a RFLP para identificar su genotipo.

Resultados: El 13,3% de los pacientes resultaron positivos para plásmido de C.tr. Todos los pacientes infectados fueron niñas con una edad media de $6,2 \pm 1,9$. El 60% de las muestras positivas fueron HF y el 40% fueron de orina. Los genotipos detectados fueron L2 y D.

Conclusiones: Contar con una técnica, que utilice muestras no invasivas para el diagnóstico de la infección por C.tr es muy importante; porque de esta manera, es posible realizar el diagnóstico y el tratamiento oportuno, sin mayores dificultades, disminuyendo el riesgo de posibles complicaciones que esta infección puede traer aparejada. La detección de C.tr en porcentajes que duplican a los datos bibliográficos, nos permite inferir que es trascendente conocer la real situación de la infección por C.tr en la boca por ser un sitio frecuente de abuso en niños. Nuestro trabajo es la primera aproximación sobre esta ITS en la cavidad oral en población vulnerable y abre puertas a futuras investigaciones.

3026

Autores: FORNERO S., PIACENZA A., BAIOTTO J., GAIT M.T., SORUCO A., FUMERO V., SORIA M., IRAZUZTA M.L., LOPEZ DE BLANC S.

VALORACION DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OCLUSIÓN y BIOTIPO FACIALES, DE LA POBLACIÓN ADULTA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Objetivos: relevar los biotipofaciales y características de oclusión de la población adulta de la ciudad de Córdoba. **Material y Métodos:** En el presente estudio, se realizó un muestreo poblacional de la ciudad de Córdoba diseñado por Dpto. Estadística y Demografía Fac Cs Económicas UNC y Programa de Estadísticas SAA UNC. La muestra estuvo compuesta por cuatrocientos voluntarios, 18 a 87 años. Previa firma del consentimiento, se realizó examen clínico facial y bucal, valorando: biotipofacial aparente y características tridimensionales de la oclusión, considerando criterios de Angle y Andrews. En el plano sagital (clase I, II o III), en el plano vertical (mordidas abiertas o cubiertas) y transversalmente (mordidas cruzadas). Los datos se registraron en formularios especialmente diseñados para este proyecto. **Estadística:** frecuencias absolutas y relativas y Chi2; ($p \leq 0,05$).

Resultados: La edad promedio fue 52,5 años, 62% femenino y 38% masculino. El biotipo Braquifacial fue más frecuente que los Dólido y Mesofaciales con un 56, 22 y 22% respectivamente ($p = 0,0001$). El 49% presentó Clase I, siendo significativamente prevalente en relación a las otras clases, de manera independiente y combinadas (II=33%, III=8%, I-II= 0,0025%, II-III= 1%, I-III= 2%; $p=0,0003$); al 8% le faltaban los primeros molares. El 66% presentó Resalte normal (+1,5 a 2,5 mm) y un 10% con Mordida invertida anterior. El 66% presentó una Relación Vertical Normal (+1,5 a 2,5 mm), 11% Mordida Abierta, 23% Sobremordida. En el plano transversal, 14% presentó Mordida Cruzada Posterior. Diastemas en el 15% y Apiñamientos en el 45%. No hubo diferencias significativas por edades, por grupos de edades ni por sexos, en ninguna de las variables evaluadas.

Conclusiones: Existe una prevalencia Braquifacial en nuestra población. Los resultados reflejan que los voluntarios presentan maloclusiones que comprometen a uno o más planos del espacio, con un porcentaje de clase II que es cuatro veces mayor que la clase III, mientras que la sobremordida duplica a la mordida abierta. En el plano transversal un 14% presentó mordida cruzada siendo un dato relevante por la complejidad de la maloclusión. Estos resultados denotan la importancia de capacitar a los profesionales en el diagnóstico precoz y prevención para evitar alteraciones en el resto de las estructuras.

3029

Autores: SORUCO A., PIACENZA A., BAIOTTO J., GAIT M.T., FORNERO S., FUMERO V., SORIA M., IRAZUZTA M.L., LOPEZ DE BLANC S.

HÁBITOS DISFUNCIONALES Y TRAUMAS ORALES: POSIBLES FACTORES DE RIESGO EN LA SALUD BUCAL EN LA POBLACIÓN ADULTA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

Introducción: Durante la infancia y adolescencia está bien descrita la presencia de hábitos orales disfuncionales (HOD), pero poco se sabe sobre su mantenimiento en la edad adulta y sobre la existencia de traumas orales (TO) de diferente etiología. **Objetivos:** Estudiar la frecuencia de HOD y TO como posibles factores de riesgo para la salud bucal de personas adultas de la Ciudad de Córdoba. **Material y Métodos:** Se realizó un muestreo poblacional de la Ciudad de Córdoba diseñado por Dpto. Estadística y Demografía Fac. Cs Económicas UNC y Programa Estadísticas SAA UNC. Participaron 400 voluntarios mayores, 18 a 87 años. La valoración clínica fue realizada por odontólogos especializados previamente calibrados, con firma de consentimiento informado. **Detección de HOD** mediante observación de praxias orofaciales y maniobras de palpación muscular. Se valoró: deglución disfuncional (DD), mordisqueo (M), indentación (I), presencia de piercing (P) y onicofagia (O), la función respiratoria se valoró con pruebas funcionales y observación de rasgos. **Valoración intraoral** para pesquisar traumas dentarios (TD), protésicos (TP), u ortodóncicos (TO) y sus combinaciones. Los datos se registraron en formularios especialmente diseñados para este proyecto y se evaluó la prevalencia por edad, por grupos de edades y por sexo. **Estadísticas:** frecuencias absolutas y relativas y Chi2 ($p > 0,05$) **Resultados:** La edad promedio fue 52,5 años, 62% femenino y 38% masculino. El 48% de la población presentó TD, en una relación significativamente superior a TP, TO y las caracterizaciones con más de un tipo de trauma (79, 12,5% y menores; $p < 0,0001$). El 76% de la población estudiada presenta HOD ($p < 0,0001$). DD: 55%; M: 19%; I: 31%; P: 3%; O: 14%, Respiración Disfuncional: 21%. No se detectaron diferencias significativas por edades, grupo de edades, ni por sexos. **Conclusiones:** La prevalencia de factores traumatizantes dentarios y protésicos es alta, al igual que la de hábitos orales disfuncionales. Tomar conocimiento de esto y difundirlo en nuestra población es clave y permitirá generar estrategias de intervención, procurando formular y desarrollar políticas de educación y promoción de salud para lograr calidad de vida de la población.

3500

Autores: COCA S. M., ABELDAÑO R.A.
Universidad de la Sierra Sur. Oaxaca, México.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA A LA SALUD EN LOS CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES CON ENFERMEDAD TERMINAL, BAJO UN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS DOMICILIARIOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA

Introducción: La calidad de vida de los cuidadores de pacientes en fase terminal, puede verse seriamente afectada. Algunos autores señalan que los cónyuges de pacientes con enfermedades terminales pueden pasar hasta 100 horas semanales abocados a su atención, esa situación puede comprometer la salud física, psicosocial y el bienestar espiritual del cuidador. Esta dimensión es de fundamental importancia para gestionar el cuidado de los pacientes con enfermedad terminal de manera integral. **Objetivo:** Analizar la calidad de vida en los cuidadores familiares de pacientes con enfermedad terminal, bajo un programa de cuidados paliativos domiciliarios en un hospital de gestión privada de la ciudad de Córdoba en el periodo diciembre 2015-abril de 2017. **Metodología:** Se realizó un estudio descriptivo y transversal en familiares cuidadores de pacientes ingresados en el Programa de Atención Domiciliaria del Hospital Privado de Córdoba. La muestra fue no probabilística de 310 pacientes y sus familiares cuidadores. El instrumento aplicado para medir calidad de vida relacionada a la salud fue el SF-36. Se realizaron análisis descriptivos exploratorios e inferenciales multivariados. **Resultados:** Se identificó un perfil de cuidador que es mujer de más de 60 años de edad, que es esposa o hija del/la paciente y que en promedio ejerce esa función por un año. Los cuidadores de 60 o más años tienen menos percepción de la calidad de vida que los cuidadores menores de 60 años en las siguientes dimensiones: rol físico, vitalidad, dolor, salud general, función física, y por último en ambos componentes sumarios de la escala: el físico y el mental. **Conclusión:** Se puede afirmar que independientemente del tipo de patología y del tiempo que pueda estar internado el paciente en atención domiciliaria, la edad de los pacientes [a partir de los 60 años] es un factor importante para la afectación de las dimensiones señaladas de la calidad de vida.

3501

Autores: ROMERO D.E., GILI J., COCA S.M., ABELDAÑO R.A., BURRONE M.S., FERNÁNDEZ R.
 Universidad Nacional de Villa María

ESTRATIFICACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

El objetivo de este trabajo fue identificar patrones de distribución espacial de vulnerabilidad social a nivel de departamento.

Se procesaron los datos censales del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2010 de la provincia de Córdoba. La base de datos utilizada fue la que contiene los datos del cuestionario ampliado. Los datos se procesaron a través del Software Redatam v6, la calibración de pesos para expandir la muestra censal fue a nivel de hogares. Se obtuvo un indicador sintético de vulnerabilidad cuyo valor puede ir de 0 a 1, asumiendo que a mayor valor mayor vulnerabilidad. Se aplicaron análisis geo-estadísticos para verificar patrones de distribución espacial de la vulnerabilidad social en la provincia de Córdoba.

Ingresaron al análisis un total de 1032620 hogares. Se obtuvo una media para el total de hogares de la provincia de Córdoba de 0,255 (DE 0,21), lo que implica que en el año 2010, unos 439.172 (42,5%) hogares quedaron por encima de esa media. Mientras que el análisis a nivel de departamentos evidenció una clara situación de desigualdad en donde los departamentos que conforman la región del norte de la provincia quedaron ubicados en los cuartiles superiores del indicador: Tulumba, Sobremonte, Río Seco, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Ischilín, Totoral, Río Primero, San Alberto y San Javier. A nivel espacial, se encontraron fuertes patrones de autocorrelación espacial (I Moran= 0,60; $p=0,0001$), en donde los departamentos del norte cordobés que evidencian mayores índices de vulnerabilidad fueron Sobremonte, Tulumba, Cruz del Eje, Minas y Pocho.

3502

Autores: BURRONE M. S., ABELDAÑO R. A., REGINATTO G. A., ROMERO D. E., ENDERS J. E., ALVARADO R., FERNÁNDEZ R.
 Universidad Nacional de Córdoba. Subsidio NIMH 1UI9MH095718

ESTIGMA INTERNALIZADO EN USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.

Introducción: El estigma internalizado se refiere a los sentimientos de devaluación, vergüenza y necesidad de aislamiento social, disparados al aplicar los estereotipos sociales negativos hacia uno mismo. En los Trastornos mentales y del comportamiento puede causar el aislamiento de la persona y el potencial fracaso de los tratamientos.

El objetivo de este trabajo fue determinar el estigma internalizado en un grupo de pacientes con trastorno mental y del comportamiento.

Métodos: El diseño del estudio fue de ensayo clínico sin grupo de control, con una muestra de 20 usuarios de los servicios públicos de salud mental de la ciudad de Córdoba a quienes se les aplicó la intervención psicossocial CTI-TS, de 9 meses de duración. El estigma se midió a través del instrumento Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) al inicio de la intervención y al final de la misma. En este trabajo se presentan los resultados de la línea de base.

Resultados: El 60% de los usuarios fue de sexo femenino, con una media de edad de 40,6 (EE=2,6) años. Entre los principales resultados se destaca que el 52,6% de los pacientes tienen niveles moderados a severos de estigma internalizado. Las dimensiones más afectadas fueron la alienación, el aislamiento social y la discriminación percibida.

Conclusión: El estigma internalizado es frecuente entre las personas que fueron diagnosticadas con un trastorno mental y del comportamiento.