



**LESIONES DE LOS DIENTES
TEMPORARIOS DEL SECTOR AN-
TERIOR DE LA BOCA**

H. Triadan

Schw. Mschft. für Zahnheikunde
65:3, 1966.

Las posibilidades de lesiones (traumáticas) de los elementos temporarios del sector anterior de la boca existen desde el mismo período de desarrollo de los mismos y su frecuencia aumenta durante el período del "aprender a caminar" hasta la edad de 4 a 5 años.

Los resultados traumáticos más frecuentes son luxaciones. Como terapia, el autor aconseja la fijación de las piezas afectadas mediante alambres a goteras de alambres yacrílico.

Si se hubieran perdido piezas dentarias, el mantenedor de espacio es absolutamente necesario. Si el paciente es menor de 5 años, incluso en el sector anterior de la boca.

En todos los casos, los padres deben ser prevenidos sobre posibles lesiones de los gérmenes permanentes.

En este sentido, los incisivos superiores son los más afectados.

G. R.

LOS RESTOS RADICULARES

E. Sonnabend

Zahnärztliche Welt Zahnärztliche
Reform. 67:18:1966.

El autor ha investigado los 10.000 tramos desdentados de 1099 pacientes. Uno de cada tres presentaba restos radiculares de los cuales no tenían conocimiento.

El diagnóstico de un resto radicular puede realizarse únicamente con la ayuda de radiografías. Lo interpretación de las mismas requiere un conocimiento acerca de las variantes radiográficas que pueden presentar aquellos restos.

El autor ha observado restos radiculares con características muy dispares en la imagen radiográfica, características estas que ha tipificado en 4 grupos:

1. El espacio periodontal está presente en la imagen.

2. El espacio periodontal puede ser reconocido parcialmente.
3. El espacio periodontal ha desaparecido, habiendo sido reemplazado por tejido graso (como lo comprobara histológicamente).
4. El espacio periodontal ha desaparecido por esclerosamiento de hueso peri-radicular.

Las variantes 3 y 4 han constituido el 7% del total de restos radiculares observados en el presente estudio.

G. R.