

**Para prevenir complicaciones,  
Ud. debe...**

- » Asegurarse que sus familiares y amigos se higienicen las manos con agua y jabón, o con un desinfectante de manos a base de alcohol. Deben realizarlo antes y después de visitar a su hijo.
- » Impedir que las visitas toquen el sitio del catéter. Explicar al niño que él tampoco debe tocar y explicarle el porqué.
- » Si su hijo usa pañales, asegúrese que el tapón y toda la tubuladura no entre en contacto con el pañal.
- » Impedir que la tubuladura se arrastre por el piso.
- » Cuando permanezca habilitado, debe controlar la estabilidad del catéter y prevenir la desconexión de tubuladuras y el desplazamiento de la aguja.
- » Cuando no esté habilitado, no es recomendable: deportes de contacto, ejercicios que requieran mover mucho el brazo, levantar peso; para evitar el desplazamiento de la cámara.



**Debe consultar de inmediato si...**

- » Durante la internación se desconecta la aguja o se despega el apósito transparente protector del catéter.
- » Su hijo siente dolor en el área de la piel alrededor del sitio del catéter.
- » Observa secreción que sale del sitio del catéter.
- » El área de la piel alrededor del catéter está enrojecida o inflamada. También si esta zona se siente tibia al tacto.
- » Su hijo tiene fiebre (38° C).

**Notas**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**¡¡IMPORTANTE!**  
Sólo el personal de enfermería de oncohematología puede manipular el catéter del niño/a

Servicios de  
Oncohematología y Enfermería  
Interno: 60721



**Folleto guía  
para padres y familia**


**CUIDADOS  
DE CATETER  
IMPLANTABLE**



A su hijo le colocarán un **Catéter Implantable**.  
Aquí encontrará información útil.  
Aún así, siéntase con libertad de consultar todas sus dudas con el personal de salud.

## ¿Qué es?

Es un dispositivo que se encuentra debajo de la piel y consta de dos estructuras; un reservorio y un tubo flexible (Catéter).



## ¿Para qué sirve?

El Porta Cath se puede utilizar para administrar prácticamente todas las medicaciones que su hijo/a necesitará, así como también para administrar sangre y hemoderivados (puede ser necesario usar una aguja más gruesa).

Rutinariamente también se utiliza este dispositivo para extraer sangre para exámenes de laboratorio y retrocultivo.

## ¿Por qué hay que colocarlo?

Se utiliza para evitar repetidos pinchazos en diferentes venas y facilita el tratamiento.

## ¿Cuánto dura?

Puede durar varios años, entre 4 y 5 aproximadamente. Si se lo cuida adecuadamente, tienen menores posibilidades de infectarse o romperse.

## ¿Cómo se coloca el portal?

El cirujano colocará el catéter mientras su hijo se encuentra en el quirófano.

Se le administrará un medicamento para ayudarlo a dormir durante el procedimiento. Inmediatamente después de la cirugía, la piel alrededor del portal se inflamará levemente.

Además, puede existir una molestia o dolor leve, hematoma y escaso sangrado.

Una vez que la inflamación desaparezca, se podrá sentir un pequeño abultamiento debajo de la piel del paciente. Ese es el reservorio. El catéter, en general, no se puede palpar.



## Los puntos de sutura ... ¿cuándo los retiran?

Los puntos de incisión del bolsillo serán extraídos entre los 8 y 10 días de colocado el catéter. Aún así, los profesionales evaluarán el proceso de cicatrización antes de la extracción de los puntos.

Mientras el portal no esté siendo utilizado la piel se puede mojar.

## Una vez colocado, ¿ya no hay que pinchar al paciente?

Este catéter está por debajo de la piel, para utilizarlo es necesario "habilitarlo", es decir, pinchar con una aguja especial (aguja Huber). Para esta habilitación, es muy importante mantener al niño quieto y contenido. Esto hace que el procedimiento sea más rápido y seguro, también evita múltiples pinchazos y disminuye el riesgo de infección.

Esta aguja debe ser cambiada cada 7 días si se encuentra internado el paciente.

## Entonces mientras esté habilitado, ¿no se puede bañar?

El baño del niño, cuando esté habilitado el catéter (durante la internación) debe ser por arrastre. No se deben mojar los dispositivos. Se recomienda utilizar paños de clorhexidina. Tomar una ducha puede permitirse sólo si se toman las precauciones para reducir la posibilidad de introducción de un organismo en el catéter.

## Purgar el catéter (mantenimiento):

Cada 20 días, por más que el catéter se encuentre sin signos de alarma, enfermería realizará una curación para prevenir una posible infección y además, se hará una purga del catéter para mantenerlo en óptimas condiciones. No es un procedimiento riesgoso, pero se requiere su colaboración. Cuanto más quieto esté su hijo, más rápido se hará el procedimiento (15 min. aproximadamente).